

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**



DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets ⁶ : C12N 15/12, C07K 14/47, 16/18, C12N 15/63, 5/10, A61K 38/17, 39/395, G01N 33/68	A1	(11) Numéro de publication internationale: WO 99/54464 (43) Date de publication internationale: 28 octobre 1999 (28.10.99)
(2.1) Numéro de la demande internationale: PCT/FR99/00957 (22) Date de dépôt international: 22 avril 1999 (22.04.99) (30) Données relatives à la priorité: 98/05033 22 avril 1998 (22.04.98) FR (71) Déposant (pour tous les Etats désignés sauf US): INSTITUT GUSTAVE-ROUSSY [FR/FR]; 39, rue Camille Desmoulins, F-94800 Villejuif (FR). (72) Inventeurs; et (75) Inventeurs/Déposants (US seulement): TRIEBEL, Frédéric [FR/FR]; 10, rue Saint-Louis, F-78000 Versailles (FR). GAUDIN, Catherine [FR/FR]; 43, avenue des Iris, F-91600 Savigny-sur-Orge (FR). (74) Mandataires: MARTIN, Jean-Jacques etc.; Cabinet Regimbeau, 26, avenue Kléber, F-75116 Paris (FR).		(81) Etats désignés: AE, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW, brevet ARIPO (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SL, SZ, UG, ZW), brevet eurasién (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet européen (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG). Publiée <i>Avec rapport de recherche internationale.</i> <i>Avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont reçues.</i>
(54) Title: MUTATED PEPTIDE COMPOUNDS, DERIVED FROM hsp70, USEFUL IN CANCER IMMUNOTHERAPY (54) Titre: COMPOSES PEPTIDIQUES MUTES, DERIVES DE hsp70, UTILES DANS L'IMMUNOTHERAPIE DU CANCER (57) Abstract <p>The invention concerns a method for identifying peptide compounds derived from hsp70, having at least one mutation relative to the hsp70 natural sequence, said compounds bringing about a response T specific of tumours, and the peptide compounds obtainable by said method. The invention also concerns the use of said peptide compounds for performing repeated immunisation in a subject so as to interrupt immune tolerance for the corresponding natural (non-mutated) peptide. Said peptide compounds are useful for preparing a medicine designed in particular for treating cancer optionally in combination with any agent provoking tumour cell stress.</p> (57) Abrégé <p>La présente invention concerne un procédé d'identification de composés peptidiques dérivés d'hsp70, qui présentent au moins une mutation par rapport à la séquence naturelle d'hsp70, lesdits composés entraînant une réponse T spécifique des tumeurs, ainsi que les composés peptidiques susceptibles d'être obtenus par ledit procédé. L'invention porte également sur l'utilisation desdits composés peptidiques pour effectuer une immunisation répétée chez un individu de sorte à rompre la tolérance immunitaire pour le peptide naturel (non muté) correspondant. Les composés peptidiques sont utiles pour la fabrication d'un médicament destiné en particulier au traitement du cancer éventuellement en association avec tout agent provoquant un stress des cellules tumorales.</p>		

UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

AL	Albanie	ES	Espagne	LS	Lesotho	SI	Slovénie
AM	Arménie	FI	Finlande	LT	Lituanie	SK	Slovaquie
AT	Autriche	FR	France	LU	Luxembourg	SN	Sénégal
AU	Australie	GA	Gabon	LV	Lettonie	SZ	Swaziland
AZ	Azerbaïdjan	GB	Royaume-Uni	MC	Monaco	TD	Tchad
BA	Bosnie-Herzégovine	GE	Géorgie	MD	République de Moldova	TG	Togo
BB	Barbade	GH	Ghana	MG	Madagascar	TJ	Tadjikistan
BE	Belgique	GN	Guinée	MK	Ex-République yougoslave de Macédoine	TM	Turkménistan
BF	Burkina Faso	GR	Grèce	ML	Mali	TR	Turquie
BG	Bulgarie	HU	Hongrie	MN	Mongolie	TT	Trinité-et-Tobago
BJ	Bénin	IE	Irlande	MR	Mauritanie	UA	Ukraine
BR	Brésil	IL	Israël	MW	Malawi	UG	Ouganda
BY	Bélarus	IS	Islande	MX	Mexique	US	Etats-Unis d'Amérique
CA	Canada	IT	Italie	NE	Niger	UZ	Ouzbékistan
CF	République centrafricaine	JP	Japon	NL	Pays-Bas	VN	Viet Nam
CG	Congo	KE	Kenya	NO	Norvège	YU	Yougoslavie
CH	Suisse	KG	Kirghizistan	NZ	Nouvelle-Zélande	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	République populaire démocratique de Corée	PL	Pologne		
CM	Cameroun	KR	République de Corée	PT	Portugal		
CN	Chine	KZ	Kazakhstan	RO	Roumanie		
CU	Cuba	LC	Sainte-Lucie	RU	Fédération de Russie		
CZ	République tchèque	LI	Liechtenstein	SD	Soudan		
DE	Allemagne	LK	Sri Lanka	SE	Suède		
DK	Danemark	LR	Libéria	SG	Singapour		
EE	Estonie						

COMPOSES PEPTIDIQUES MUTES, DERIVES DE hsp70, UTILES DANS L'IMMUNOTHERAPIE DU CANCER.

5 La présente invention concerne un procédé d'identification de composés peptidiques dérivés d'hsp70, qui présentent au moins une mutation ou une altération par rapport à la séquence naturelle d'hsp70, lesdits composés entraînant une réponse T spécifique des tumeurs, ainsi que les composés peptidiques susceptibles d'être obtenus par ledit procédé. L'invention porte également sur l'utilisation de ces composés peptidiques pour
10 effectuer une immunisation répétée chez un individu de sorte à rompre la tolérance immunitaire pour le peptide naturel (non muté) correspondant. Les composés peptidiques sont utiles pour la fabrication d'un médicament destiné en particulier au traitement du cancer éventuellement en association avec tout agent provoquant un stress des cellules tumorales.

15

Depuis longtemps, les chercheurs ont tenté de trouver des mécanismes pour stimuler le rejet immunitaire des tumeurs en partant de l'hypothèse que des antigènes, pouvant servir de cibles, sont exprimés à la surface des cellules cancéreuses. L'équilibre délicat entre la croissance et la régression des tumeurs a fait l'objet de multiples théories,
20 notamment en ce qui concerne le rôle du système immunitaire. L'immunosurveillance est une théorie séduisante selon laquelle les tumeurs sont détruites au tout premier stade de leur développement par les mécanismes des défenses immunitaires. Par exemple, l'observation que de nombreuses tumeurs sont infiltrées par des cellules lymphoïdes semble être un signe de pronostic favorable.

25

Cependant, l'incidence des cancers chez des individus immunodéficients n'est pas significativement supérieure à la population générale. Ce fait a été corrélé par des expériences réalisées sur des souris immunodéficientes (nude mice). En effet, ces souris élevées en conditions stériles, ne développent pas plus de tumeurs que les souris de
30 génotype sauvage. Ainsi, il est communément admis aujourd'hui que le risque très légèrement accru d'apparition de cancers chez les individus immunodéficients est directement corrélé avec l'incidence des infections virales (virus oncogènes). Cela

suggère que la réponse immunitaire interviendrait en limitant la dissémination de virus et en reconnaissant les cellules cancéreuses porteuses d'antigènes viraux. Lors qu'un virus oncogène intègre le génome de la cellule hôte, il y a expression par lesdites cellules de protéines modifiées qui sont susceptibles de constituer des cibles antigéniques.

Mais en ce qui concerne les tumeurs d'origine non virale, le problème majeur pour les défenses immunitaires provient du fait qu'ils n'existent pas de flagrantes différences antigéniques avec les cellules normales. C'est pourquoi ces tumeurs échapperaient dans une certaine mesure à l'immunosurveillance. Certains antigènes spécifiquement exprimés par des tumeurs non virales ont été mis en évidence. Par exemple, la protéine CALLA (Common Acute Lymphoblastic Leukemia Antigen), normalement exprimée dans les cellules hématopoïétique et réprimée dans les lymphocytes B matures normaux, se retrouve surexprimée dans les lymphoblastes. Donc, les protéines antigéniques des tumeurs ne sont pas étrangères à l'organisme et sont naturellement présentes dans certaines cellules normales.

Ainsi, ce qui distingue les protéines antigéniques, et ce qui est susceptible d'être reconnu par les défenses immunitaires, est une mutation, une altération (par exemple une modification post traductionnelle d'un acide aminé) ou une distribution différentielle ou encore une surexpression. Il est clair que la reconnaissance desdites protéines par les lymphocytes est réduite du fait de leur présence intrinsèque dans les cellules normales (sélection clonale négative). L'homme du métier doit donc résoudre ce problème afin de trouver un mécanisme d'activation efficace des défenses immunitaires vis-à-vis des cellules cancéreuses. Le défi est d'autant plus grand que la concentration des antigènes est faible et que leur présentation par les molécules du CMH est parfois inadéquate.

L'objectif est donc d'identifier des peptides antigéniques spécifiques des tumeurs qui doivent être capables de stimuler efficacement les défenses immunitaires in vivo, en particulier les lymphocytes T cytotoxiques. Ces peptides peuvent servir de vaccin comprenant en option des co-stimulateurs tels que des cytokines et des lymphokines.

Farace et al, (1997), a démontré que l'induction de la réponse inflammatoire dans l'hypersensibilité de type retardé et au site du vaccin chez un patient immunisé, provient du recrutement de seulement quelques clones de cellules T. Ces cellules correspondent aux lymphocytes infiltrés à l'intérieur d'une tumeur et déjà amplifiés avant immunisation. Ainsi, les antigènes des tumeurs peuvent être utilisés pour recruter et amplifier localement les lymphocytes T spécifiques des tumeurs. Les cellules activées in vivo peuvent être d'avantage amplifiées par l'administration d'IL-2. En effet, Kumar A. et al (1996), a montré que l'activité des clones des cellules T est induite dans le sang, et dans les tumeurs, des patients recevant l'IL-2.

Il a été difficile d'isoler et d'amplifier les clones des Lymphocytes T cytotoxiques (CTL) spécifiques des cellules du carcinome du rein, Bernhard et al, (1994), et Brouwenstijn et al, (1996). Cette difficulté provient du défaut de prolifération des lymphocytes infiltrés dans une tumeur (TIL), particulièrement dans les cellules du carcinome du rein (RCC), Alexander et al, (1993). Cependant certains résultats indiquent que les RCC pourraient être immunogéniques in vitro car ces tumeurs sont souvent largement infiltrées par les lymphocytes T, en particulier par les lymphocytes TCR α/β ⁺ DR⁺ Th1- polarisés, Angevin et al, (1997), et à cause du taux de réponse relativement élevé (15 à 20%) à certains protocoles d'immunothérapie, Rosenberg et al, (1992).

Un antigène, reconnu par des CTL autologues du RCC, a été identifié par Gaugler et al, (1996). Cet antigène est codé par un gène, appelé RAGE 1, qui est exprimé dans de nombreuses tumeurs mais qui est absent des tissus adultes normaux, sauf ceux de la rétine. Il est clair que l'utilisation de RAGE 1 pour l'immunothérapie du cancer présente des problèmes car cela pourrait générer des réactions de rejet auto-immunitaires de la rétine. Des préparations, comportant l'association hsp-peptide isolée à partir de cellules cancéreuses ou de cellules infectées par des virus, confèrent une protection immunitaire vis-à-vis des tumeurs et des cellules infectées, Blachere et al, (1997). D'autres documents, tels que WO 97/10001, WO 97/06828, WO 97/26910, Tamura et al, (1993) et (1997), concernent le traitement de cellules néoplastiques par des complexes hsp70-peptides dérivés de cellules cancéreuses. Ces documents de l'art antérieur décrivent la capacité d'hsp70 à absorber comme une éponge les peptides des cellules. L'isolement d'hsp70 provenant de cellules cancéreuses permet d'identifier de multiples fragments

protéiques de tumeurs qui peuvent potentiellement être antigéniques. Il a maintenant été trouvé qu'il existe des mutations ou des altérations dans la protéine hsp70 exprimée dans les tumeurs, et que de telles mutations ou altérations s'avèrent être immunogènes. Sachant qu'hsp70 peut être surexprimée dans les tumeurs, lesdits peptides sont utiles pour induire une rupture de tolérance contre hsp70.

Ainsi, aucun document de l'art antérieur ne divulgue, ni ne suggère la présente invention telle que définie ci-dessous.

Description de l'invention

La présente invention concerne un procédé d'identification de composés peptidiques dérivés d'hsp70, qui présentent au moins une mutation ou une altération par rapport à la séquence naturelle d'hsp70, lesdits composés entraînant une réponse T spécifique des tumeurs, comprenant les étapes suivantes :

- a) Amplification PCR d'un fragment d'ADN codant pour hsp70 obtenu à partir d'une ou de plusieurs tumeur(s),
- b) clonage de l'ADN obtenu à l'étape a) dans un vecteur capable de se répliquer dans une bactérie,
- c) séquençage dudit fragment dans chaque colonie bactérienne obtenue après culture des bactéries de l'étape b) et identification de la ou des mutation(s) dans hsp70.
- d) détermination de l'immunogénicité des fragments peptidiques mutés parmi ceux identifiés à l'étape c). Avantageusement, l'étape d) consiste en un test Elispot. Il est possible de tester simplement l'immunogénicité des fragments peptidiques qui possèdent une séquence d'ancrage pour une molécule HLA donnée (voir ci-dessous procédé de « reverse immunology »).

Les fragments peptidiques à tester à l'étape d) peuvent aisément être obtenus par synthèse chimique à partir des connaissances générales dans le domaine technique.

On entend par « hsp70 » dans le cadre de l'invention aussi bien hsp70-1 que hsp70-2.

Le test Elispot est largement décrit dans les documents de la technique antérieure. Par exemple, Herr et al, (1998) concerne une méthode Elispot pour détecter et quantifier des lymphocytes T CD8 + sécrétant du TNF- α . En résumé, des plaques MultiScreen-HA (Millipore, Bedford, MA) sont recouvertes avec un anticorps anti-TNF- α (clone 195 ;

Boehringer Mannheim) et des lymphocytes T CD8 + sont ajoutés en présence de peptides antigéniques. Le TNF- α sécrété est détecté avec un anticorps anti-TNF- α de lapin (Serotec, Oxford, UK), un anticorps anti-IgG de lapin couplé avec de la biotine (Boehringer Mannheim) et le complexe biotine-avidine-peroxidase (Vector, Burlingame, CA). Le nombre et la surface des zones où la cytokine est présente sont déterminés automatiquement par ordinateur, (Herr et al, 1997). D'autres documents tels que Herr et al, (1996) section matériels et méthodes paragraphe 2 pages 132 à 135, et Scheibenbogen et al, (1997) page 933 décrivent cette méthode et sont également incorporés dans la description par référence.

10

L'invention porte également sur un procédé de mise en évidence de mutations ou d'altérations ponctuelles artificielles susceptibles d'augmenter l'immunogénicité des composés peptidiques mutés dérivés d'hsp70 caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes :

- 15 a) Détermination de fragments possédant une séquence d'environ 9 à 10 acides aminés comportant un motif d'ancrage pour une molécule HLA donnée,
- b) introduction d'une mutation ou d'une altération ponctuelle supplémentaire au niveau des résidus 4, 5, 6, 7 ou 8,
- c) détermination de l'immunogénicité des fragments peptidiques obtenus à l'étape b).

20 De préférence, l'étape c) consiste en un test Elispot.

Ce procédé est bien connu par l'homme du métier. On peut notamment incorporer par référence dans la description les enseignements qui se trouvent à l'adresse internet suivante:

www.bimas.dcrf.nih.gov/molbio/hla_bind/

- 25 Ce procédé permet de déterminer toute mutation ou altération ponctuelle artificielle (non présente dans les tumeurs humaines) qui serait susceptible d'améliorer le principe actif (le peptide muté immunogène) en employant la méthode dite de «reverse immunology». A partir de la connaissance de la séquence en acides aminés d'une protéine, telle que hsp70, il est possible de prédire quels sont les peptides pouvant se lier
- 30 à une poche HLA quelle que soit sa spécificité (HLA-A2, HLA-A1, HLA-B7...), puis de tester ces peptides in vitro pour leur capacité à se lier effectivement à l'allèle HLA considéré, puis à introduire une mutation ou une altération ponctuelle sur les acides

aminés sur certaines positions critiques pour l'affinité. Le programme informatique BIMAS permet d'obtenir une telle prédiction. Les règles générales concernant les acides aminés impliqués dans l'ancrage aux molécules HLA sont présentées dans Parker et al, (1992 et 1994) et Rammensee et al, (1995). Ces informations sont incorporées par
5 référence dans la description. Bien entendu, le procédé selon l'invention ne se limite pas à l'utilisation du programme BIMAS, et peut être mis en œuvre avec tout programme équivalent.

Un autre aspect de l'invention concerne un composé peptidique susceptible d'être
10 obtenu à partir d'un procédé décrit ci-dessus. Ce composé se caractérise en ce qu'il comprend une séquence d'au moins 8 acides aminés consécutifs d'hsp70, en ce qu'il présente au moins une mutation ou une altération par rapport à la séquence naturelle d'hsp70, et ce qu'il entraîne une réponse T spécifique.

Un aspect particulier porte sur un composé peptidique ayant au moins 80 %
15 d'homologie avec les acides aminés entre les positions 286 et 294 d'hsp70.

De préférence, l'acide aminé à la position 293 est l'isoleucine, la leucine, la valine, l'alanine, la glycine, ou la phénylalanine, plus particulièrement l'isoleucine. Les composés peptidiques préférés de l'invention ont au moins une des séquences suivantes :

- 20 - SEQ ID n°1 : 286.SLFEGIDIY.294
 - SEQ ID n°2 : 286.SLFEGIDIYT.295.

Lesdits composés peuvent également comporter des acides aminés non naturels qui peuvent être équivalents ou non aux acides aminés naturels.

25 On entend par « composé peptidique » une entité constitué au minimum par un fragment peptidique d'hsp70 tel que défini ci-dessus ou par une succession desdits fragments peptidiques, et ayant éventuellement un ou plusieurs autres éléments différents des acides aminés naturels ou non naturels. Ces éléments ont pour but de
30 protéger chimiquement ou physiquement lesdits fragments peptidiques, et/ou de favoriser leur absorption par l'organisme, et/ou leur administration, et/ou leur biodisponibilité. Par exemple, cette protection permet aux peptides d'atteindre leurs cibles sans subir l'action de diverses protéases présentes dans l'organisme. De telles

modifications chimiques peuvent également augmenter l'affinité d'un peptide antigénique pour les molécules HLA-A2 et permettre une efficacité accrue du vaccin in vivo, Rosenberg et al, (1998).

Lesdits éléments peuvent être par exemple:

- 5 - Des groupes chimiques protecteurs connus par l'homme du métier réagissant aux extrémités NH₂ et/ou COOH d'un peptide, cette modification ne baissant pas significativement le caractère immunogénique du peptide.
- Des groupes chimiques améliorant l'efficacité du vaccin in vivo.
- Des lipides ou des acides gras que l'on attache de façon covalente aux fragments
10 peptidiques pour former des composés peptidiques appelés lipopeptides. L'acide palmitique en est un exemple parmi d'autres, Vitiello et al, (1995), incorporé dans la description par référence.
- Une protéine porteuse desdits fragments peptidiques possédant des sites de restriction et permettant l'acheminement des fragments peptidiques intacts jusqu'à
15 leurs sites d'action dans l'organisme.

Un deuxième aspect de l'invention concerne les fragments d'ADN codant pour les fragments peptidiques ci-dessus mentionnés. On entend par « fragments d'ADN » des fragments simples brins, double brins, d'ADN, d'ADNc et/ou d'ARN. La séquence
20 nucléotidique correspondant à la séquence d'acides aminés desdits fragments peptidiques peut varier de manière à comprendre tous les différents codons possibles pour un acide aminé donné selon le principe de la dégénérescence du code génétique. La présente invention a également pour objet un vecteur d'expression d'un fragment peptidique contenant un fragment d'ADN ci-dessus mentionné, fusionné à un promoteur
25 fort et efficace dans les cellules eucaryotes, et/ou dans les cellules procaryotes, en particulier dans les cellules humaines. Le vecteur peut être viral, plasmidique, ou un pseudo-vecteur et peut comporter des marqueurs de sélection et exprimer des adjuvants immunologiques tels que des cytokines et/ou des lymphokines.

L'invention concerne également des cellules dendritiques chargées en composés
30 peptidiques, et des cellules dendritiques transformées par le vecteur d'expression exprimant les fragments peptidiques. Ces cellules peuvent être aussi des macrophages. Nestle et al, (1998), décrit une méthode de vaccination qui consiste à charger les cellules dendritiques prises à un patient par des peptides antigéniques (en culture in

vitro), et les injecter dans le système lymphatique de ce même patient. Cette publication est incorporée dans la description par référence.

5 Un autre aspect de l'invention a pour objet une composition pharmaceutique comprenant un composé peptidique ou un mélange de composés peptidiques selon l'invention et un véhicule pharmaceutiquement acceptable. Cette composition peut comporter en outre un ou plusieurs adjuvants immunologiques, notamment des facteurs cytotoxiques des tumeurs.

10 L'invention porte aussi sur une composition pharmaceutique comprenant un vecteur d'expression tel qu'il est mentionné ci-dessus et un véhicule pharmaceutiquement acceptable ou un fragment d'ADN selon l'invention ou bien encore les cellules indiquées ci-dessus et un véhicule pharmaceutiquement acceptable.

15 Un aspect supplémentaire de l'invention concerne un produit de combinaison comprenant au moins un composé peptidique selon l'invention et au moins un agent induisant un stress cellulaire pour une utilisation simultanée, séparée ou étalée dans le temps destiné au traitement du cancer. De préférence, ledit agent peut être susceptible d'induire une surexpression des protéines de chocs thermiques, en particulier hsp70. Avantagusement, cet agent est un inducteur de l'apoptose, sélectionné notamment
20 parmi les agents qui endommagent l'ADN, les ligands du récepteur aux glucocorticoïdes, ou parmi les seconds messagers pro-apoptotiques.

Le produit de combinaison peut comprendre un vecteur viral qui possède un gène qui code pour une enzyme permettant d'activer lesdits agents pro-apoptotique, notamment la thymidine kinase.

25

On désigne par « agent induisant un stress cellulaire » tout agent susceptible d'induire une surexpression des protéines de chocs thermiques, en particulier hsp70. Ces agents peuvent être notamment des inducteurs de l'apoptose. On entend par « agent inducteur de l'apoptose » toute substance qui directement ou indirectement affecte la viabilité d'une
30 cellule.

Ledit agent inducteur de l'apoptose de la présente invention peut être sélectionné notamment parmi les agents qui endommagent l'ADN, les ligands du récepteur aux glucocorticoïdes, ou parmi les seconds messagers pro-apoptotiques.

Ces agents peuvent être sélectionnés de préférence parmi ceux couramment employés dans le traitement du cancer. Ainsi, ledit second messenger pro-apoptotique est notamment sélectionné parmi les composés suivants :

- Les dérivés des glucocorticoïdes,
- parmi les agents alkylants tels que les moutardes à l'azote, par exemple la cyclophosphamide,
- 10 - les complexes de Platine, par exemple la cisplatine,
- les dérivés de l'éthylène-imine, de diméthane sulfonyl-alkanes,
- les dérivés de la pipérazine,
- parmi les inhibiteurs des topoisomérases tels que les inhibiteurs de la topoisomérase 2, par exemple les anthracyclines, l'épidophyllotoxine tel que l'étoposide, les
- 15 inhibiteurs de la topoisomérase 1, par exemple les dérivés de la camptothécine,
- parmi les antimétabolites tels que les antifolates, par exemple le méthotrexate, les antipurines, par exemple la 6-mercaptopurine, les antipyrimidiques, par exemple la 5-fluorouracile,
- parmi les antimitotiques tels que les vinca-alcaloïdes, les taxoïdes tel que le taxotère,
- 20 - et parmi les cytolytiques divers tels que la bléomycine, la dacarbazine, l'hydroxycarbamide, l'asparaginase, la mitoguanine, la plicamycine.

Ces agents antinéoplasiques sont décrits dans Actualité Pharmaceutiques n°302 (Oct 1992) pages 38 à 39 et 41 à 43 incorporées dans la description par référence.

25 On peut également choisir ledit agent inducteur de l'apoptose parmi les radiations gamma utilisées en radiothérapie, l'étoposide, la doxorubicine, la dexaméthasone, la céramide telle que la ceramide C8, la lonidamine. Certains desdits agents anticancéreux, sont plus particulièrement décrits dans US 5,260,327 qui concerne l'utilisation de la lonidamine pour traiter les métastases, dans JO 5017353 qui porte l'utilisation de la

30 lonidamine en association avec d'autres agents anticancéreux, et dans EP 291151, qui décrit l'utilisation des dérivés de la phlorizine. Ces documents sont incorporés dans la description par référence.

Le produit selon la présente invention peut également comprendre un vecteur viral qui possède un gène qui code pour un enzyme qui permet d'activer les composés et/ou les agents susmentionnés, par exemple la thymidine kinase. De nombreux brevets portant
5 sur l'utilisation de gènes suicides activés dans des tissus spécifiques, en particulier pour sensibiliser les cellules cancéreuses aux analogues de nucléotides. Parmi ces documents, incorporés dans la description par référence, on trouve : EP 494776, EP 690129, EP 657540, et EP 657541 qui concernent notamment la fabrication d'un médicament comprenant un vecteur qui possède un gène capable de catalyser le passage d'une pro-
10 drogue en substance active. Plus particulièrement, EP 657539 a pour objet l'utilisation du gène de la thymidine kinase avec une spécificité cellulaires pour le traitement du cancer.

Dans un autre mode de mise en œuvre, l'agent induisant un stress cellulaire est
15 sélectionné parmi les composés induisant une hypoxie des tumeurs, notamment parmi les inhibiteurs de l'angiogénèse. On peut notamment citer l'endostatine et l'angiostatine décrites par J. Folkman, les thrombospondine-1 et -2 (TSP-1, -2) Locopo et al (1998) ; les facteurs IFN gamma, TNFalpha, et IL-1alpha , Maier et al (1999), U-995, un inhibiteur dérivé du cartilage de requin, Sheu et al (1998). Ces publications, la revue sur
20 les inhibiteurs naturels, Paper et al (1998), et la revue générale sur les différents inhibiteurs connus, Harris et al (1998) sont incorporées par référence dans la description.

La composition pharmaceutique ou le produit de combinaison selon l'invention peut
25 comporter en outre un ou plusieurs adjuvants immunologiques, notamment des agents cytotoxiques des tumeurs. Ces produits peuvent comporter un véhicule pharmaceutique compatible avec une administration IV, subcutanée, orale, ou nasale, de préférence sélectionné parmi les liposomes, les nano-particules, ou les émulsions lipidiques, chargés positivement ou négativement.

30

La présente invention concerne également l'utilisation d'un composé peptidique selon l'une des revendications 7 à 11 pour la fabrication d'un médicament, notamment destiné

au traitement du cancer, en particulier des tumeurs solides, notamment des carcinomes, des mélanomes, des neuroblastomes, des cancers du cou et de la tête, de préférence des carcinomes du rein. Ce médicament peut être destiné à une immunisation ex situ ou in situ. L'invention porte aussi sur l'utilisation dudit composé peptidique pour augmenter
5 en milieu de culture la population des CTL des tumeurs et/ou induire la sécrétion par lesdits CTL de facteurs cytotoxiques tels que par exemple IL-2, IFN- γ et TNF et/ou pour stimuler les défenses immunitaires, en particulier pour augmenter la population des CTL des tumeurs et/ou induire la sécrétion par lesdits CTL de facteurs cytotoxiques tels que par exemple IL-2, IFN- γ et TNF.

10 Bien entendu, on peut utiliser les compositions et produits de l'invention en combinaison avec la radiothérapie.

Avantageusement, on peut mettre à profit les compositions et produits de l'invention pour effectuer une immunisation répétée en vue de provoquer une rupture de tolérance contre le peptide naturel correspondant (non muté) chez un patient. En effet, sachant
15 que hsp70 est ou peut être surexprimée dans les tumeurs, il est tout à fait intéressant de pouvoir immuniser les patients contre cette protéine. Une immunisation avec les peptides mutés de cette protéine est susceptible de rompre la tolérance du système immunitaire des patients vis-à-vis de hsp70, et dès lors de stimuler spécifiquement les lymphocytes T cytotoxiques et helper contre les cellules cancéreuses quelque soit le
20 type de cancer ou de patient.

Un aspect complémentaire de l'invention porte sur un procédé de production d'un anticorps qui se lie à un mutant d'hsp70, en particulier au mutant hsp70-2 I-293, comprenant les étapes consistant à :

- 25 a) Immuniser un mammifère avec un composé peptidique selon l'invention,
b) isoler un anticorps monoclonal qui se lie à hsp70-2-293, particulièrement à hsp70-2 I-293, dans un essai immunologique.

La présente invention comprend aussi un anticorps monoclonal qui se lie à hsp70-2-293, particulièrement à hsp70-2 I-293 et un procédé de détection de la mutation ou de
30 l'altération d'hsp70-2-293, en particulier de la mutation ou de l'altération hsp70-2 I-293, dont les étapes consistent à :

- a) Mettre en contact un échantillon prélevé chez un individu avec un ledit anticorps monoclonal,
- b) permettre la formation du complexe anticorps- hsp70-2-293,
- c) détecter hsp70-2-293 au moyen d'un marqueur détectable dans le complexe ou qui se lie au complexe.

Dans un mode supplémentaire de réalisation, la présente invention concerne une trousse de diagnostic comportant notamment un ou plusieurs desdits anticorps. Cette trousse peut notamment servir pour la détection du cancer et pour le pronostic du cancer déclaré chez un individu. Enfin, l'invention a également pour objet une composition pharmaceutique comprenant un ou plusieurs desdits anticorps monoclonaux et un véhicule pharmaceutiquement acceptable. La présente invention concerne, au même titre, l'utilisation de la composition pharmaceutique susmentionnée en médecine, pour la fabrication d'un médicament, notamment pour le traitement du cancer, en particulier pour le traitement des tumeurs solides, avantageusement des carcinomes, des mélanomes, des neuroblastomes, des cancers du cou et de la tête, de préférence des carcinomes du rein.

Description détaillée de l'invention.

20

L'objet de présente invention permet donc de stimuler les défenses immunitaires en augmentant la population des CTL spécifiques des tumeurs et en induisant la sécrétion par lesdits CTL de facteurs cytotoxiques. Une telle amplification des CTL spécifiques revient à entraîner et à agrandir une véritable armée de cellules qui détruisent les tumeurs. En effet, les Lymphocytes T cytotoxiques jouent un rôle particulier dans la reconnaissance des antigènes et s'infiltrant à l'intérieur même des tumeurs solides. L'activité des CTL consiste à reconnaître l'antigène associé aux molécules de classe I du CMH syngénique. Les CTL et la cellule cible forment alors une liaison par l'association TCR-CD8 au CMH I.

30

Les étapes du mécanisme de la cytotoxicité sont les suivantes :

- Reconnaissance, liaison hautement spécifique, et formation du complexe ternaire TCR-CD8-MCHI(peptide antigénique).

- Sécrétion par les CTL de la perforine et des différentes enzymes en direction de la membrane de la cellule cible.
- Formation de canaux dans la membrane de la cellule cible par polymérisation de la perforine par une enzyme en présence de calcium (canaux polyperforines).
- 5 - Passage de protéases et de toxines à travers les canaux et action à l'intérieur de la cellule cible.
- D'autres facteurs toxiques tels que le TNF- α , la lymphotoxine (TNF- β), et l'IFN- γ libérés par les CTL se fixent sur des récepteurs spécifiques de la membrane de la cellule cible. On observe alors une apoptose, caractérisée par la fragmentation de
- 10 l'ADN, par des bourgeonnements de la membrane cytoplasmique, par la désintégration de la cellule en petits fragments (corps apoptotiques).

Un objet de l'invention est donc de fournir à l'organisme des quantités suffisantes de peptides à fort potentiel immunogénique et spécifiques des tumeurs. De tels fragments

15 peptidiques sont très rares, dilués parmi une infinité de peptides, et difficiles à identifier. En effet, la liaison des peptides avec la molécule du CMH se situe dans une invagination de topologie et de propriétés physico-chimiques précises, qui varient selon la nature des acides aminés impliqués. Ainsi un peptide (environ 9 acides aminés) se lie à un CMH en fonction de la nature de ces chaînes latérales et de sa complémentarité

20 avec la cavité de la molécules du CMH. Cette association au CMH se réalise dans des organismes intracellulaires particuliers. Les protéines antigéniques sont généralement dégradés en peptides dans les protéasomes (complexes de protéinases multicatalytiques ubiquitaires) avant le transport desdits peptides dans le réticulum endoplasmique rugueux (RER). La synthèse des CMH I et l'assemblage avec les peptides a lieu dans le

25 RER. Puis les complexes antigène-CMH I sont exportés à la surface des cellules en passant par l'appareil de Golgi. On comprend donc pourquoi seuls certains peptides peuvent se lier au CMH I. En ce qui concerne les peptides de la présente invention, on a démontré (V. infra) qu'ils possèdent une constante de dissociation K_d très faible (très forte association). En ce sens, ils permettent d'activer le système immunitaire

30 efficacement, en particulier les CTL.

Les CTL spécifiques du RCC peuvent être isolés à partir des lymphocytes infiltrés dans la tumeur (TIL) d'un patient. Au moins 80% des TIL du RCC sont des cellules CD8⁺ DR⁺ LAG-3⁺ activées, Angevin et al, (1997). A la suite d'une courte activation in vitro de ces TIL, une réponse de type polarisé Th1 a été observée (sécrétion d'IL-2 et d'interféron γ , mais pas d'IL-4). En revanche, Finke et al, (1993) a publié que le défaut apparent d'activité des TIL in vivo est dû aux mauvais fonctionnement des différentes cascades de régulation dans ces cellules. Cependant, parmi les 5 CTL décrits dans la présente invention, le clone 2A11 (TCRBV1JIS6) est particulièrement intéressant puisqu'il est amplifié au site de la tumeur et représente jusqu'à 3% des TCR α/β ⁺ TILs. De plus, ce clone reconnaît un antigène spécifique des tumeurs présenté par HLA-Cw16, Angevin et al, (1997). Ceci démontre donc que les molécules HLA-C sont capables de présenter des éléments au site de la tumeur chez ce patient.

hsp70 est codé par le locus dupliqué (hsp70-1, hsp70-2) localisé dans la région MHC à 92 Kb du gène C2 en direction du télomère, Milner et al, (1990). Ce segment d'ADN est appelé région de classe IV et comprend au moins 7 gènes impliqués dans les réponses inflammatoires et de stress, Gruen, (1997). Les deux gènes sans intron (hsp70-1 et hsp70-2) codent pour une protéine identique de 641 acides aminés. Il y a quelques différences de séquences dans la région promotrice et une complète divergence dans la région 3' non traduite. En utilisant une sonde spécifique d'hsp70-2, on a montré une élévation de la quantité d'ARNm (2,4 Kb) à la suite d'un choc thermique. La sonde hsp70-2 a permis de détecter une faible quantité de d'ARNm de 2,4 Kb dans l'ARN constitutif des lignées cellulaires de la tumeur RCC et dans des échantillons chirurgicaux congelés de ladite tumeur. La raison pour laquelle la lignée cellulaire allogénique HLA-A2⁺ RCC, qui exprime de faibles niveaux d'ARNm hsp70-2, n'a pas été tuée par CTL 11C2, peut être due à la différence observée lors des essais de sensibilisation de la cible (Target Sensitization Assays) entre les peptides mutés et le décapeptide sauvage 286-295 (5×10^{-11} M et 5×10^{-8} M respectivement pour la demi-lyse maximale). La transcription et la surexpression d'hsp70-2 sauvage dans les cellules COS-7 induisent la sécrétion de TNF par CTL 11C2.

On sait que les hsp sont des molécules non polymorphiques, qui ne diffèrent pas dans leur structure primaire parmi les tissus normaux et les cancers ou parmi les cellules normales et les cellules infectées par des virus. Ainsi, la capacité d'immunisation de préparations comprenant hsp est due à l'association des molécules hsp avec des peptides générés par les cellules dans lesquelles les hsp ont été isolés. En effet, les complexes hsp-peptides peuvent être générés in vitro et l'activité biologique de tels complexes est comparable à celle des complexes hsp-peptide générés in vivo, Blachère et al, (1997). Si cette observation démontre que les hsp sont des adjuvants élicitant une réponse des cellules T CD8⁺, nos résultats indiquent que certains fragments peptidiques d'hsp70 sont directement immunogènes.

Pour la suite de la description et pour les exemples, on se référera aux figures dont la légende est indiquée ci-dessous.

Légendes

Figure 1 : Activité spécifique lytique du clone 11C2 contre la lignée cellulaire autologue RCC-7.

La cytotoxicité des CTL-11C2 vis-à-vis de la lignée cellulaire RCC-7 a été testée par l'expérience standard de relargage du chromium (chromium release assay) à différents ratios effecteur/cible (ratio E/C). L'inhibition de l'activité cytotoxique de 11C2 a été testée après plusieurs préincubations des CTL pendant deux heures avec le mAb (anticorps monoclonal) de classe 1 anti-HLA indiqué, à une concentration de saturation prédéterminée.

Figure 2 : Sécrétion de TNF par le clone CTL-11C2 lors de la stimulation avec la lignée cellulaire autologue RCC-7.

5 000 CTL ont été incubés avec 20 000 cellules RCC-7. La quantité de TNF a été mesurée après 20 heures de culture, en testant la toxicité des surnageants avec des cellules WEHI-164 (clone 13) sensibles au TNF. L'inhibition de la sécrétion de TNF a été testée après préincubation du clone 11C2 pendant deux heures avec le mAb anti-HLA de classe 1 tel qu'indiqué.

Figure 3 : Cytotoxicité des CTL 11C2 sur de multiples lignées cellulaires allogéniques RCC.

11C2 a été testé sur la lignée autologue RCC-7 et sur de multiples lignées cellulaires allogéniques RCC (RCC-8, RCC-9, RCC-10 et RCC-11) lors d'une expérience standard de relargage du chromium au ratio E/C indiqué. Les molécules HLA partagées avec RCC-7 sont indiquées entre parenthèses.

Figure 4 : Stimulation du CTL 11C2 par les cellules co-transfectées d'une manière transitoire avec l'ADNc HLA-A*0201 autologue et l'ADNc A18.

On a rajouté le CTL 11C2 48 heures après la co-transfection. Le TNF contenu dans les surnageants a été estimé 20 heures après en testant sa toxicité sur les cellules WEHI-164 (clone 13). Les cellules stimulatrices comprennent la lignée cellulaire RCC-7 comme contrôle positif et les cellules COS-7 non transfectées ou transfectées avec l'ADNc HLA*0201 seul, comme contrôle négatif.

Figure 5 : Localisation de la région épitopique d'hsp70-2 reconnu par le CTL 11C2.

(A) La longueur totale du l'ADNc hsp70-2 est représentée schématiquement en noir et blanc. 5' UT et 3' UT correspondent aux régions non traduites 5' et 3' respectivement. La région codante (en noir) commence avec le site d'initiation de la traduction (codon ATG) et correspond au nucléotide +1. Les multiples clones tronqués obtenus à partir de l'ADNc A18 sont représentés en gris. L'ADNc A18 commence au nucléotide 577 de la région codante. Le nucléotide muté est marqué par une astérisque (position 877).

(B) illustre la stimulation du CTL 11C2 par les cellules COS-7 co-transfectées temporairement avec le l'ADNc HLA-A*0201 autologue et avec chacun des différents ADNc A18 tronqués. Les cellules transfectées ont été incubées pendant 24 heures avec 5 000 CTL 11C2 et la quantité de TNF a été mesurée 20 heures après. Les cellules stimulatrices contrôles comprennent les cellules COS-7 non transfectées ou transfectées avec l'ADNc A18 seul comme contrôle négatif et co-transfectées avec les ADNc A18 et A*0201 comme contrôle positif.

Figure 6 : Lyse par CTL 11C2 de la lignée cellulaire autologue transformée par EBV et incubée avec les peptides codés par hsp70-2

2 000 cellules transformées par EBV, marquées avec Cr ⁵¹ ont été incubées pendant 1 heure en présence des peptides d'hsp70-2 indiqués à de multiples concentrations. CTL 11C2 a ensuite été ajouté à un ratio effecteur/cible (E/C) de 31/1. Le relargage du chrome a été mesuré 4 heures après. Les astérisques indiquent l'acide aminé muté.

Figure 7 : Induction de l'expression d'HLA-A2 sur les cellules T2 par les peptides antigéniques d'hsp70-2.

Les cellules T2 ont été incubées à 26° C pendant 16 heures en milieu privé de sérum, avec ou sans peptide à une concentration de 20 µM. Ensuite, les peptides ont été de nouveau rajoutés et les cellules ont été incubées à 37° C. Aux intervalles de 30 minutes ou d'une heure, les culots des cellules ont été collectés et le changement de l'expression d'HLA-A2 a été analysé par cytométrie de flux avec un mAb anti-HLA-A2 (MA2.1). Les séquences d'acides aminés des peptides sont représentées, l'acide aminé muté est représentée par une astérisque.

Figure 8 : Analyse Northern Blot

L'ARN cytoplasmique total (15 µg), dérivé de la tumeur RCC-7 (rangé n°1), de la lignée cellulaire RCC-7 (n°2), et la lignée cellulaire autologue transformée par EBV (n°3), soit maintenu à 37°C (sous-rangé C) ou traité par choc thermique pendant 2 heures à 40° C (sous-rangé HS), a été fractionné sur gel d'agarose-formaldéhyde dénaturant et transféré sur membrane de nylon Hybond-N+. Le Northern Blot a été hybridé par les sondes constituées d'un fragment spécifique d'hsp70 et de l'ADNc de la glycéraldéhyde-3-phosphate-déshydrogénase (GAPDH). La position de la migration des ARN 28s et 18s est présentée. Le transcript hsp70-2 d'environ 2, 4 Kb est indiqué par une flèche au-dessus de l'ARN 18s et de l'ARNm GAPDH.

Figure 9 : Test Elispot

Cette figure montre que la mutation ou l'altération entraîne un pouvoir d'immunogénicité très augmenté. hsp muté est le composé peptidique selon l'invention,

hsp nat est le peptide correspondant naturel (non muté), MP est le contrôle positif (peptide très immunogène de la protéine « matrix protein » et T2 est le contrôle négatif (cellules non stimulées par le peptide).

5 Les travaux de la présente invention ont permis l'isolation de clones CTL-RCC provenant de TIL (lymphocytes infiltrés dans la tumeur) obtenus lors de trois expériences différentes et en utilisant deux conditions expérimentales (utilisation de IL-2 ou de IL-2 + IL-7 + IL-12). Entre le 20^{ème} et le 30^{ème} jour, les cellules, appartenant aux cultures qui montrent une lyse importante de la lignée cellulaire autologue de la tumeur RCC-7, ont été clonées par dilution limite. Sur 8 clones obtenus par ce
10 protocole, 5 ont été retenus en fonction de leur phénotype TCR distinct. Tous les clones sont des cellules cytotoxiques CD4⁻ CD8⁺ TCR α/β ⁺ et produisent TNF lorsqu'ils sont stimulés par des cellules autologues de la tumeur. L'effet bloquant des mAb anti-classe 1 WC/32 a montré que l'activité cytotoxique est restreinte aux molécules CMH I (Figure
15 1). L'activité lytique du clone 11C2 a été bloquée par mAb MA2.1 spécifique de HLA-A2 (figure 2). Ce résultat suggère que HLA-A2 est la molécule de présentation pour 11C2, et que 11C2 reconnaît les cellules autologues des tumeurs (figure 3).

Identification de l'ADNc de l'antigène reconnu par CTL 11C2

20 Afin d'identifier le gène codant pour l'antigène on a utilisé une approche génétique, comprenant la transfection d'une librairie d'ADNc provenant de la tumeur RCC dans des cellules COS-7 avec l'ADNc codant pour la molécule HLA-A2 de présentation, Seed B., (1987). Le vecteur d'expression utilisé contient l'origine de réplication de SV40, ce qui
25 permet une multiplication considérable des épisomes du plasmide transfecté et donc une expression élevée des gènes transfectés. On a utilisé une librairie d'ADNc construite dans le vecteur d'expression pcDNA I en utilisant les ARN provenant de la lignée cellulaire RCC-7. Cette librairie a été divisée en 400 parties de 200 plasmides recombinants et chaque partie a été co-transfectée en double avec la construction
30 pcDNA I HLA-A*0201 autologue dans les cellules COS-7. Les cellules COS-7 ont ensuite été testées pour leur capacité à stimuler la production de TNF par le clone 11C2. Après 48 heures, les cellules COS-7 co-transfectées ont été incubées durant la nuit avec

11C2 et la concentration de TNF dans le surnageant a été déterminée par son action cytotoxique sur des cellules WEHI. La quantité de TNF dans les surnageants est en dessous de 5 pg/ml sauf pour deux paires (40 et 45 pg/ml) d'expériences dupliquées. Le deuxième criblage a été réalisé en transfectant les cellules COS avec 100 parties de 20 plasmides recombinants provenant de l'extraction de doubles positifs. Enfin, un troisième criblage nous a conduit à l'isolation de deux clones d'ADNc (appelés A8 et B65), qui permettent de transférer l'expression de l'antigène dans les cellules COS-7 HLA-A*0201⁺. Les résultats obtenus avec le clone d'ADNc A18 est présenté à la figure 4.

La séquence du plus long ADNc (A18) est de 1,9 Kb avec une homologie de 100% aux nucléotides de 577 à 2876 de l'ADNc d'hsp70-2, à l'exception d'une mutation à la position 877 (une adénine au lieu d'une thymine). La position +1 est le site d'initiation de la traduction d'hsp70-2, Milner et al, 1990.

Dans le but d'identifier la longueur totale de l'ADNc d'hsp70-2 et pour vérifier si la mutation est seulement présente au site de la tumeur, nous avons réalisé une PCR (hsp70-2 est un gène sans intron) sur l'ADN provenant de l'extraction des cellules RCC-7 et des cellules B transformées par EBV et des blastes PHA. Un produit unique de 2 Kb, correspondants au nucléotide -36 -1974, a été obtenu dans chacun des cas et a été subcloné dans le vecteur pcDNA 1 pour séquençage et expression. 4 des 7 clones d'ADN, obtenus à partir du fragment de la tumeur, possède la mutation. Pour les cellules transformées par EBV et les blastes, aucune des 14 séquences d'ADN analysées ne porte la mutation. Ainsi, la mutation est présente seulement sur un chromosome dans les cellules tumorales et absente dans les cellules normales.

Identification du peptide antigénique

Afin de délimiter la région nucléotidique minimale codant pour le peptide antigénique, de multiples ADNc tronqués ont été obtenus à partir du clone d'ADNc A18. L'utilisation de l'exonucléase III a permis de générer progressivement des délétions à partir de l'extrémité 3' de l'ADNc (figure 5). Ces fragments d'ADNc ont été co-transfectés dans les cellules COS-7 avec l'ADNc HLA-A*0201 autologue. Une région nucléotidique minimale codante a été localisée entre les nucléotides 730 et 944. La troncation dans la

20
région portant l'unique mutation spécifique de la tumeur abolit la reconnaissance par CTL 11C2. On a recherché des peptides portant le motif de liaison HLA-A*0201 dans cette région et parmi les 18 peptides testés, seulement 2 (le nonapeptide SLFEGIDIY, acides aminés 286 à 294, et le décapeptide SLFEGIDIYT, acides aminés 286 à 295),
5 portant le résidu mutant isoleucine à la position 8, furent reconnu. La demi-lyse maximale a été obtenue avec seulement 5×10^{-11} M du décapeptide comparée à 5×10^{-7} M du nonapeptide (figure 6). CTL 11C2 reconnaît également le décapeptide sauvage 286-295 (SLFEGIDFYT) avec une demi-lyse maximale de 5×10^{-8} M mais pas le nonapeptide sauvage 286-294 (figure 6).

10

Liaison des fragments peptidiques d'hsp70-2 à HLA-A2

Les peptides antigéniques, pouvant lier HLA-A2, peuvent réguler positivement l'expression des molécules HLA-A2 dans les cellules T2, Nijman et al. (1993). La
15 capacité de liaison des décapeptides 286-295 d'hsp70-2 (muté et sauvage) a été comparée à celle du nonapeptide 286-294. La liaison de ces deux décapeptides est stable sur une période de 4 heures à 20 μ M sans présenter de différence entre les formes mutantes et sauvages (figure 7). Les nonapeptides hsp70-2 sont moins efficaces, mais leur liaison est comparable à celle du peptide MART-1₂₇₋₃₅ sur HLA-A2. Comme on
20 pouvait s'y attendre, aucun effet n'a été observé pour le peptide contrôle HLA-B7 (voir figure 7).

Analyse Northern blot

25 Une sonde spécifique au locus hsp70-2, incluant la région 3' non traduite, a été utilisée pour examiner l'expression du gène hsp70-2. Un ARNm de 2,4 Kb a été mis en évidence dans les cellules autologues transformées par EBV. De même, un faible niveau d'expression a été observé dans les cellules RCC-7 non traitées et dans les échantillons chirurgicaux congelés de RCC-7 (figure 8). De faibles niveaux d'expression ont
30 également été observés dans d'autres tumeurs, notamment dans les mélanomes, les neuroblastomes, les adénocarcinomes du colon et les fragments de tumeurs de la vessie.

Exemple 1 : Etablissement des lignées cellulaires RCC.

Les lignées cellulaires ont été établies à partir des cellules du carcinome du rein RCC comme décrit précédemment par Angevin et al, 1997. En résumé, les tumeurs primaires
5 ont été obtenues à partir de patients non traités qui ont subi une néphrectomie radicale en notre institution. Le patient 7 (HLA-A2, -A29 -B44, -B51 -Cw15, -Cw16) est un individu mâle de 54 ans avec un RCC métastatique. Après chirurgie et digestion enzymatique, des suspensions de cellules fraîches des tumeurs RCC ont été
10 ensemencées dans un milieu de culture composé de Dulbeccos Modified Eagle Medium (DMEM), pénicilline (50 IU/ml), streptomycine (50 µg/ml), 1% de L-glutamine à 200 mM, 1% de sodium pyruvate à 200 mM, 10% de sérum fœtal de veau (FCS), et 1% de Ultrosor G (Gibco-BRL, Paisley, UK). Ce milieu est appelé dans la suite du document « milieu RCC ». Toutes les lignées des cellules tumorales ont été maintenues dans ce milieu RCC. La lignée cellulaire RCC-7 a été obtenu à partir de la tumeur primaire du
15 patient 7.

Exemple 2 : Cellules et milieux de culture

La lignée cellulaire autologue EBV a été obtenue après infection de PBMC du patient 7.
20 La lignée cellulaire transformée par EBV a été maintenue dans RPMI 1640 (Gibco-BRL), supplémentée avec 10% de FCS.

Le clone 13 de WEHI-164, une lignée cellulaire du fibrosarcome de la souris sensible à TNF, a été fourni avec diligence par Benoit Van Den Eynde (Ludwig Institute for Cancer Research, Bruxelles, Belgique) et a été mis en culture dans RPMI 1640
25 (Seromed, Biochrom KG, Berlin, Allemagne) supplémenté avec de la L-glutamine, du sodium pyruvate, des antibiotiques, et 5% de FCS à une concentration de 0,01 à 0,05 x 10⁶ cellules/ml.

La lignée cellulaire humaine mutante CEM x 721.174.T2 (T2), Salter et al, (1989), a été maintenue dans RPMI-1640 supplémenté avec 10% de FCS. Cette lignée cellulaire a
30 été fournie avec diligence par Pierre Langlade (Institut Pasteur, Paris, France). Toutes les cultures cellulaires ont été maintenue dans une atmosphère saturée en eau, et avec une teneur de 5% en CO₂.

Exemple 3 : Etablissement des lignées cellulaires TIL

Les TIL, provenant des suspensions de la tumeur, ont été inoculés dans des flasques contenant RPMI 1640, de la pénicilline, de la streptomycine, 1% de L-glutamine, 1% de sodium pyruvate et 8% de sérum humain AB (Institut Jacques Boy S.A., Reims, France), appelées milieu complet. Les TIL ont été ensemencés à la même concentration en milieu complet supplémenté avec 10 IU/ml de rIL-2, 50 IU/ml de rIL-7 (Sanofi, Toulouse, France) et 10 IU/ml de rIL-12 (Genetics Institute, Cambridge, MA) pendant trois jours. A partir du 3^{ème} jour, les TIL ont été nourris en utilisant le milieu complet avec 30 IU/ml de rIL-2, 50 IU/ml de rIL-7 et 10 IU/ml de rIL-12. Le phénotype et l'activité cytotoxique des lignées cellulaires TIL ont été caractérisés après 14 et 21 jours de stimulation.

Exemple 4 : Anticorps monoclonaux (mAb), agent sérologique, et analyse phénotypique

Les mAb conjugués soit à la fluorescéine (FITC) ou avec la phycoérythrine (PE), dirigés contre le TCR α/β , CD3 (Leu4), CD4 (Leu3a), CD8 (Leu8), CD80 (B7.1), HLA DR (L249), ont été achetés chez Becton Dickinson (Mountain View, CA). CD56 (NKH1A) provient de Coultronics (Hialeah, FL). Les TIL ont été caractérisés par double immunocoloration en incubant les cellules pendant 30 mn à 4° C avec FITC- ou PE-mAb. L'analyse de cytométrie de flux a été réalisée sur un FACScan (Becton Dickinson) et en utilisant le logiciel Cellquest. Les ascites du Laboratoire ont été W6.32 (anti-HLA-A/B/C), MA2.1 (anti-HLA-A2 et -B17) et B1.23.2 (anti-HLA-B/C) et ont été sélectionnés pour les expériences fonctionnelles et d'immunofluorescence à des concentrations de saturation prédéterminées jusqu'à une dilution finale entre 1/200 et 1/2000.

Exemple 5 : Clonage des lignées cellulaires TIL

Après 3 semaines de culture, les lymphocytes ont été clonés en les diluant jusqu'à la limite. Le clonage a été réalisé entre 600 à 0,6 cellules/puits dans des plaques à 96 puits contenant le milieu RPMI, supplémenté de 8% de sérum humain AB, 30 IU/mL de rIL-2 et 3% de TCGF. Au fond des puits, on a cultivé une couche nourricière constituée de cellules tumorales autologues irradiées (1×10^4 / puits), de lymphocytes allogéniques irradiés (8×10^4 par puits) et de cellules irradiées transformées par EBV (2×10^4 / puits). Les clones ont été nourris 3 fois par semaine avec le milieu complet contenant rIL2 et TCGF. Le phénotype immunologique et la cytotoxicité ont été caractérisés pour les cellules clonées.

Exemple 6 : Test de cytotoxicité

Les tests de cytotoxicité ont été réalisés en utilisant l'expérience standard de libération du chrome pendant 4 heures comme précédemment décrit, Angevin et al (1997). En résumé, 2×10^3 cellules cibles marquées au Cr^{51} ont été incubées pendant 4 heures à 37°C avec les cellules effectrices à différents ratio E/T dans un volume final de 200 μl . Concernant l'inhibition de la lyse par les mAb, les cellules cibles ont été préincubées pendant deux heures en présence de concentrations saturantes de mAb avant l'addition des cellules effectrices. A la fin de l'incubation, 40 μl de surnageant ont été transférés sur plateau « Lumaplate 96 solid scintillation plates » (Packard Instruments, Meriden, CT), ont été séchés toute la nuit, et comptés dans un compteur de radioactivité Beta (Packard Instruments).

Exemple 7 : Clonage et expression des molécules HLA

Les allèles HLA de classe I ont été clonés en utilisant la méthode PCR décrite par Ennis et al, (1990), avec quelques légères modifications. L'ARN total a été préparé à partir de la lignée cellulaire RCC-7 en utilisant RNA^B (Bioprobe Systems). Le premier brin d'ADNc a été synthétisé avec une sonde oligo(dT) et la reverse transcriptase

(Invitrogen). L'ADNc a servi de matrice pour une amplification PCR à 30 cycles avec les sondes suivantes :

- 5P2-H (5'-GGGCAAGCTTGGACTCAGAATCTCCCCAGACGCCGAG-3'), SEQ ID n°3

5 - 3P2-X (5'-GCCCTCTAGATCTCAGTCCCTCACAAGGCAGCTGTC-3'), SEQ ID n°4

Ces sondes correspondent respectivement aux séquences consensus des régions non traduites 5' et 3' des allèles de classe I. Ces sondes sont identiques aux sondes HLA-5P2 et HLA-3P2 décrites précédemment, Ennis et al. (1990), sauf pour le site de clonage (on a remplacé les sites Sal I et Hind III pour 5P2 et Hind III et Xba I pour 3P2 respectivement. Les produits PCR ont été digérés avec Hind III et Xba I et ligaturés dans le plasmide pcDNA I (Invitrogen). Ces constructions ont été transfectées dans E. Coli MC 1061/P3. L'ADN plasmidique a ensuite été extrait à partir de plusieurs colonies en utilisant des colonnes QIAGEN (Qiagen). Le séquençage de l'ADN a été réalisé en utilisant "ABI PRISM Dye Terminator cycle sequencing ready reaction kit", (Applied Biosystems) et un séquenceur d'ADN automatique. Les séquences ont été comparées aux séquences nucléotidiques HLA de classe I disponibles dans les banques de données.

20 Exemple 8 : Construction de la librairie d'ADNc

L'ARN Poly(A)⁺ a été extrait à partir de la lignée cellulaire RCC-7 en utilisant le système d'isolation d'ARNm (Fast Track kit 2.0, Invitrogen) en respectant les instructions du fabricant. Le premier brin de l'ADNc a été synthétisé en utilisant la transcriptase inverse AMV avec une sonde oligo-dT contenant un site Not I à son extrémité 5'. L'hybride ARN-ADNc créé par la synthèse du premier brin, a été transformé en ADNc double brin par l'ADN polymérase I en combinaison avec la Rnase H et l'ADN ligase d'E. Coli. Ensuite, on a utilisé l'ADN polymérase T4 pour faire une coupure franche dans l'ADNc. Des adaptateurs BstX I ont été rajoutés et la taille de l'ADNc a été obtenue par fractionnement sur gel d'agarose. L'ADNc de taille voulue (supérieure à 800 nucléotides) a été ligaturé à l'intérieur du vecteur pcDNA I coupé par BstX I/Not I et la souche E. Coli appropriée (MC1061/P3) a été transformée. Pour les

expériences de criblage, l'ADN plasmidique obtenu à partir de certaines colonies de bactéries a été préparé selon le protocole suivant : 100 ou 200 colonies, cultivées en milieu LB-agar (avec 30 µl/ml d'ampicilline et 10 µl/ml de tétracycline), ont été ensemencées dans 2 ml de milieu LB et incubées toute la nuit à 37° C. L'ADN plasmidique a été extrait en utilisant la méthode de lyse alcaline, Birnboim et al, (1979) et a été resuspendu dans 30 µl dans Tris 10mM-EDTA 1mM pH 7,5 contenant 20 µl/ml d'RNase A. La concentration de l'ADN plasmidique a été ajustée à 40 ng/µl.

Exemple 9 : Transfection des cellules COS-7 et criblage des transfectants

10

Les expériences de transfection ont été réalisées par la méthode "DEAE-dextran-chloroquine, Brichard et al. (1993). Trois jours avant la transfection, les cellules COS-7 ont été ensemencées dans des plaques avec 96 micropuits à la concentration de 5×10^3 cellules/puits dans 150 µl de milieu RPMI contenant 20% de sérum fœtal de veau. Pour la transfection, le milieu a été remplacé par 30 µl de DEAE-Dextran/mélange d'ADN. Ces mélanges ont été préparés pour des doubles transfections dans des micropuits en rajoutant séquentiellement :

- 200 ng d'ADN plasmidique provenant de la librairie d'ADNc,
- 200 ng de plasmide pcDNA I/HLA-A*0201,
- 20 - 25 µl de NaCl à 150 mM, Tris 10 mM, pH 7,4 (appelé tampon TBS),
- 35 µl de TBS contenant 1 mg/ml de DEAE-Dextran (Pharmacia Biotech Europe GmbH, Saclay, France).

Les cellules ont été incubées avec ce mélange plus 150 µl de DMEM supplémenté avec 10% de « NuSerum » non complémenté (Becton Dickinson) et 100 mM de chloroquine (Sigma-Aldrich Chimie SARL, Saint Quentin Fallavier, France), pendant 30 minutes à température ambiante. Ensuite les cellules ont été incubées 4 heures à 37° C sous une atmosphère de 5% en CO₂. Après incubation, le milieu a été enlevé, et les cellules ont été incubées 2 mn dans PBS 1x contenant 10% d'une solution de diméthylsulfoxyde. Les cellules ont été lavées 1 fois avec PBS 1x et incubées dans RPMI contenant 10% FCS pendant 48 heures. Le milieu a alors été enlevé et les cellules ont été lavées 1 fois avec PBS 1x. 5 000 CTL ont été rajoutés aux puits dans 100 µl de RPMI contenant 10%

30

de FCS. Après 20 heures, le surnageant a été collecté et sa teneur en TNF a été déterminée en testant sa cytotoxicité sur les clones 13 WEHI-164 dans un test colorimétrique MTT(3-[4,5-diméthylthiozole]-2,5-diphényle-tétrazolium bromide (Sigma-Aldrich), comme décrit précédemment, Traversari et al. (1992). Concernant l'inhibition de la sécrétion de TNF par les mAb, les cellules cibles ont été préincubées pendant 2 heures en présence d'une concentration saturante de mAb avant l'addition des cellules effectrices pendant 20 heures de plus.

Exemple 10 : Test PCR pour l'isolation de la longueur totale d'hsp70-2

10

L'ADN génomique a été extrait à partir de la lignée cellulaire RCC-7 avec DNAzolTM (Life Technologies). 1 µl de l'ADN a été utilisé pour une réaction PCR en utilisant l'ADN polymérase Taq (Perkin Elmer). Les sondes suivantes ont été utilisées :

- la sonde hsp70-2A, 5'-GGGCAAGCTTAGTCTCAGAGCGGAGCCAAC-3' (nucléotides -36 à -18, sense), SEQ ID n°5,
- la sonde hsp70-2B, 5'-GCCCTCTAGAGTCCCAACAGTCCACCTCAA-3' (nucléotides 1955 à 1974, anti-sense), SEQ ID n°6.

Ces sondes contiennent les sites de restriction Hind III et Xba I respectivement. Les conditions pour la PCR ont été 98° C pendant 1 mn suivie de 30 cycles d'amplification (98° C pendant 15 sec, 65° C pendant 1 mn, 72° C pendant 2 mn, avec une extension finale pendant 10 mn à 72° C). Le produit PCR obtenu a été digéré par Hind III et Xba I, purifié sur billes de verre absorbant (Geneclean) et a ensuite été sous-cloné dans les sites Hind III et Xba I du vecteur d'expression pcDNA 1 pour séquençage et cotransfection avec HLA-A*0201 dans les cellules COS-7.

25

Exemple 11 : Identification de la région minimale nucléotidique codante pour le peptide antigénique

L'ADNc A18 a été isolé à partir de la librairie d'ADNc fabriqué à partir du vecteur d'expression pcDNA 1. Le plasmide a été digéré avec Sph I et Xba I avant traitement avec l'exonucléase III afin de générer des délétions progressives à partir de l'extrémité 3' de l'ADNc A18. Afin d'obtenir un nombre important de clones d'ADNc tronqués, on a

30

utilisé le "Exo Mung Bean Deletion Kit" (Stratagene). Après ligature, la bactérie E. Coli MC1061/P3 a été transformée avec les ADNc tronqués. L'ADN plasmidique a été extrait à partir de chaque clone, puis séquencé et cotransfecté avec HLA-A*0201 dans les cellules COS-7.

5

Exemple 12 : Synthèse et test de reconnaissance des peptides

Dans le test de criblage, les peptides utilisés ont été synthétisés par la "PepSet technology" (Chiron Technologies, Suresnes, France). Pour les tests fonctionnels, les peptides ont été synthétisés sur phase solide en utilisant F-moc (protection NH₂-terminale temporaire) et ont été purifiés par HPLC préparative. L'HPLC analytique indique que les peptides sont purs au moins à 95%. Les peptides lyophilisés ont été dissous à 10 mM de DMSO dans l'eau et conservés à -20° C. On a utilisé les peptides lors d'un test de libération du chrome. 2 000 cellules autologues transformées par EBV, et marquées au Cr⁵¹, ont été incubées pendant 1 heure à 37° C sur des plaques à 96 puits avec diverses concentrations de peptides avant d'ajouter CTL 11C2.

15

Exemple 13 : Test de liaison des peptides

Les cellules T2, Nijman et al. (1993), ont été cultivées 48 heures avant le test dans un milieu AIM-V privé de sérum (Gibco-BRL). Pour les tests de liaison, les cellules T2 (10⁶) ont été incubées à 26° C pendant 16 heures dans le même milieu dans 0,8% de DMSO, avec ou sans peptide à une concentration de 20 µM. Ensuite les peptides (20 µM) ont été de nouveau rajoutés et les cellules ont été incubées à 37° C. A des intervalles de 30 mn ou d'une heure, les culots des cellules ont été collectés et le niveau d'expression d'HLA-A2 a été suivi en utilisant le mAb anti-HLA-A2 (MA2.1).

25

Exemple 14 : Isolation de l'ARN et analyse Northern blot

Les cellules ont été soit maintenues à 37° C ou ont subi un choc thermique à 42° C pendant 2 heures avant récupération par centrifugation. L'ARN total a été extrait par

30

lyse au guanidinium isothiocyanate et a été ultracentrifugé dans du chlorure de césium. Des échantillons d'ARN total (15 µg) ont été fractionnés dans un gel dénaturant contenant 1% d'agarose-formaldéhyde et ont été transférées sur membranes de nylon Hybond-N+ en respectant les instructions du fabricant (Amersham France S.A, les Ulis, France). Le Northern blot a été hybridé avec une sonde spécifique d'hsp70-2 (nucléotides 1955 à 2159) et avec la sonde glycéraldéhyde-3-phosphate-déshydrogénase (GAPDH). Toutes les sondes ont été marquées avec dCTP [³²P] (3000 Ci mmol⁻¹) en utilisant le Prime-ITTM II Random Primer labeling Kit (Stratagene). L'hybridation a été réalisée à 45° C pendant 16 heures avec la sonde d'hsp70-2 (10⁶ cpm/ml) et la sonde GAPDH (10⁵ cpm/ml). Les membranes ont été lavées deux fois avec 2 x SSC à température ambiante, une fois pendant 45 mn avec 2 x SSC/0.1 % SDS à 62° C et une fois à 62° C pendant 10 mn avec 0,1 x SSC, avant autoradiographie à 80° C pendant 11 jours.

Exemple 15 : Test Elispot

Des cellules CD8+ ont été isolées à partir de donneurs HLA-A2 positifs par purification immunomagnétique négative (utilisation d'anticorps contre les cellules CD4 et CD56). Dans des plaques à 96 puits dont le fond est recouvert par de la nitrocellulose (Millipore), 100000 cellules CD8+ ont été directement ajoutées à 100000 cellules T2 HLA-A2.1 positives chargées avec 10⁻⁶ M de peptides. Après stimulation des cellules CD8+ pendant 20 heures, un test Elispot-IFN γ a été effectué. Les résultats sont présentés dans le tableau I ci-après. Le contrôle positif est le peptide MP ou « matrix protein », protéine d'enveloppe du virus influenza qui est très immunogène chez l'homme.

TABLEAU I : Résultats du test Elispot-IFN γ .

	donneur 1	donneur 2	donneur 3	donneur 4	donneur 5
T2 seule	6	1	3,833	11,5	3,75
MP	57,25	31,33	13,33	26,5	16,5
hsp muté	13	4,167	7,5	19,25	5,75
Hsp nat	5	2,167	4	13,75	2

Ces résultats montrent qu'il est possible d'induire des lymphocytes CD8 humains de sujets sains HLA-A2* avec le composé peptidique préféré de l'invention (SEQ ID n° 1 et 2), mais pas avec le peptide non muté correspondant. Il ressort clairement que la mutation entraîne un pouvoir d'immunogénicité très augmenté puisque des lymphocytes
5 qui n'ont jamais été stimulés par ce peptide sont capables de sécréter de l'interféron gamma en 24 heures sans aucune mise en culture in vitro ou addition de cytokines.

REFERENCES

- Alexander J. P., Kudoh S., Melsop K. A., Hamilton T. A., Edinger M. G., Tubbs R. R.,
5 Sica D., Tuason L., Klein E., Bukowski R. M., and Finke J. H. 1993. T-cells infiltrating
renal cell carcinoma display a poor proliferative response even though they can produce
interleukin 2 and express interleukin 2 receptors. *Cancer Res.* 53:1380.
- Angevin E., Kremer F., Gaudin C., Hercend T., and Triebel F. 1997. Analysis of T-cell
10 immune response in renal cell carcinoma: polarization to type 1-like differentiation
pattern, clonal T cell expansion and tumor-specific cytotoxicity. *Int. J. Cancer* 72:431.
- Bernhard H., Karbach J., Wolfel T., Busch P., Storkel S., Stockle M., Wolfel C., Seliger
B., Huber C., Buschenfelde K. H.M.z., and Knuth A. 1994. Cellular immune response
15 to human renal-cell carcinomas : definition of a common antigen recognized by HLA-
A2 restricted cytotoxic T-lymphocyte (CTL) clones. *International Journal of Cancer*
59:837.
- Birnboim H. C., and Doly J. 1979. A rapid alkaline extraction procedure for screening
20 recombinant plasmid DNA. *Nucleic Acid. Res.* 7:1513.
- Blachere N.E., Li Z., Chandawarkar R. Y., Suto R., Jaikaria N. S., Basu S., Udon H.,
and Srivastava P. K. 1997. Heat shock protein-peptide complexes, reconstituted in vitro,
elicit peptide-specific cytotoxic T lymphocytes response and tumor immunity. *J. Exp.*
25 *Med.* 186:1315.
- Brichard V., Pel A. V., Wölfel T., Wölfel C., Plaen E. D., Lethé B., Coulie P., and Boon
T. 1993. The tyrosinase gene codes for an antigen recognized by autologous cytolytic T
lymphocytes on HLA-A2 melanomas. *J. Exp Med.* 178:489.
- 30 Brouwenstijn N., Gaugler B., Kruse K.M., Spek C.W.V.d., Mulder A., Osanto S.,
Eynde B.J.V.d., and Schrier P.I. 1996. Renal-cell carcinoma-specific lysis by cytotoxic

T-lymphocyte clones isolated from peripheral blood lymphocytes and tumor-infiltrating lymphocytes. *Inter. J. Cancer* 68:177.

Ennis P. D., Zemmour J., Salter R.D., and Parham P. 1990. Rapid cloning of HLA-A,B cDNA by using the polymerase chain reaction: Frequency and nature of errors produced in amplification. *Proc. Natl. Acad. Sci.* 87:2833.

Even J., Lim A., Puisieux I., Ferradini L., Dietrich P. Y., Toubert A., Hercend T., Triebel F., Pannetier C., and Kourilsky P. 1995. T-cell repertoires in healthy and diseased human tissues analysed by T-cell receptor beta-chain CDR3 size determination : evidence for oligoclonal expansions in tumours and inflammatory diseases. *Research Immunology.* 146:65.

Farace F., Angevin E., Poullion I., Leboullaire C., Ferir G., Elias D., Escudier B., and Triebel F. 1997. T-cell receptor CDR3 size distribution analysis to evaluate specific T-cell response to cancer vaccines. *Inter. J. Cancer* 71:972.

Finke J. H., Zea A. H., Stanley J., Longo D. L., Mizoguchi H., Tubbs R.R., Wiltout R. H., O'Shea J. J., Kudoh S., Klein E., Bukowski R. M., and Ochoa A. C. 1993. Loss of T-cell receptor zeta chain and p56lck in T-cells infiltrating human renal cell carcinoma. *Cancer Research.* 53:5613.

Gaugler B., Brouwenstijn N., Vantomme V., Szikora J. P., Spek C. W. V. d., Patard J. J., Boon T., Schrier P., and Eynde B. J. V. d. 1996. A new gene coding for an antigen recognized by autologous cytolytic T lymphocytes on a human renal carcinoma. *Immunogenetics.* 44:323.

Genevee C., Diu A., Nierat J., Caignard A., Dietrich P. Y., Ferradini L., Roman-Roman S., Triebel F., and Hercend T. 1992. An experimentally validated panel of subsfamily-specific oligonucleotide primers (Valpha1-w29/Vbeta1-w24) for the study of human T cell receptor variable V gene segment usage by polymerase chain reaction. *Eur. J. Immunol.* 22:1261.

Gruen J. R., and Weissman S. M. 1997. Evolving views of the major histocompatibility complex. *Blood*. 90:4252.

- 5 Harris SR; Thorgeirsson UP, Tumor angiogenesis: biology and therapeutic prospects, *In Vivo* 1998 Nov-Dec;12(6):563-70

Herr W, Protzer U, Lohse AW, Gerken G, zum Buschenfelde KHM, Wolfel T.

- 10 Quantification of CD8+ Lymphocytes Responsive to Human Immunodeficiency Virus (HIV) Peptide Antigens in HIV-Infected Patients and Seronegative Persons at High Risk for Recent HIV Exposure. *Journal of Inf Dis* 1998 ; 178 :260-265.

Herr W, Schneider J, Lohse AW, zum Buschenfelde KHM, Wolfel T.

- 15 Detection and quantification of blood derived CD8+ T lymphocytes secreting tumor necrosis factor alfa in response to HLA-A2.1 binding melanomy and viral peptide antigens. *Journal of Imm Meth* 191 ; 1996 ; 131-142.

Herr W, Linn B, Leister N, Wandel E, Meyer zum Buschenfelde KH, Wolfel T.

- 20 The use of computer-assisted video image analysis for the quantification of CD8+ T lymphocytes producing tumor necrosis factor spots in response to peptide angigens. *Journal of Imm Meth* 1997 ; 203 :141-152.

Kumar A., Farace F., Gaudin C., and Triebel F. 1996. Clonal T cell expansion induced by interleukin-2 therapy in blood and tumors. *J. Clin. Invest.* 97:1219.

25

Locopo N; Fanelli M; Gasparini G, Clinical significance of angiogenic factors in breast cancer, *Breast Cancer Res Treat* 1998;52(1-3):159-73

Maier JA; Morelli D; Lazzerini D; Menard S; Colnaghi MI; Balsari A,

- 30 Inhibition of fibronectin activated migration of microvascular endothelial cells by IL1 alpha, TNF alpha and IFgamma , *Cytokine* 1999 Feb;11(2):134-9

Milner C. M., and Campbell R. D.. 1990. Structure and expression of the three MHC-linked hsp70 genes. *Immunogenetics*. 32:242.

Milner C. M., and Campbell R. D. 1992. Polymorphic analysis of the three MHC-linked hsp70 genes. *Immunogenetics*. 36:357.

Nestle F. O., Alijagic S., Gillet M., Sun Y., Grabbe S., Dummer R., Burg G. et Schadendorf D.. 1998. Vaccination of melanoma patients with peptide or tumor lysate-pulsed dendritic cells. *Nature Medicine* 3 328:332

Nijman H. W., Houbiers J. G., Vierboom M. P., Burg S. H. v. d., Drijfhout J. W., D'Amato J., Kenemans P., Melief C. J., and Kast W. M. 1993. Identification of peptide sequences that potentially trigger HLA-A2.1-restricted cytotoxic T lymphocytes. *Eur. J. Immunol.* 23(6):1215.

Pannetier C., Cochet M., Darche S., Casrouge A., Zoller M., and Kourilsky P. 1993. The sizes of the CDR3 hypervariable regions of the murine T-cell receptor beta chains vary as a function of the recombined germ-line segments. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 90:2472.

Paper DH, Natural products as angiogenesis inhibitors, *Planta Med* 1998 Dec;64(8):686-95

Rosenberg S. A. 1992. The immunotherapy and gene therapy of cancer. *Journal of Clinical Oncology* 10:180.

Rosenberg S. A., Yang J. C., Schwartzentruber D. J., Hwu P., Marincola F. M., Topalian S. L., Restifo N. P., Dudley M. E., Schwartz S. L., Spiess P. J., Wunderlich J. R., Parkhurst M. R., Kawakami Y., Seipp C. A. Einhorn J. H. et D. E. White. 1998. Immunologic and therapeutic evaluation of a synthetic peptide vaccine for the treatment of patients with metastatic melanoma. *Nature Medicine* 3 321 :327

Salter R. D., Norment A. M., Chen B.P., Clayberger C., Kresky A.M., Littman D. R., and Parham P. 1989. Polymorphism in the alpha3 domain of HLA-A molecules affects binding to CD8. *Nature* 338:345

- 5 Scheibenbogen C, Lee KH, Stevanovic S, Witzens M, Willhauck M, Waldmann V, Nacher H, Rammensee HG, Keilholz U.

Analysis of the T cell response to tumor and viral peptide antigens by an IFN-gamma ELISPOT assay. *Int Journal Cancer* 1997 ; 932-936.

- 10 Sheu JR; Fu CC; Tsai ML; Chung WJ, Effect of U-995, a potent shark cartilage-derived angiogenesis inhibitor, on anti-angiogenesis and anti-tumor activities, *Anticancer Res* 1998 Nov-Dec;18(6A):4435-41

- 15 Traversari C., Van der Bruggen P., Luescher I.F., Lurquin C., Chomez P., Van Pel A., De Plaen E., Amar-Costesec A., and Boon T. 1992. A nonapeptide encoded by human gene MAGE-1 is recognized on HLA-A1 by cytolytic T lymphocytes directed against tumor antigen MZ2-E. *J. Exp. Med.* 176:1453.

- 20 Vitiello A., Ishioka G., Grey H. M., Rose R., Farness P., LaFond R., Yuan L., Chisari F., V., Furze J., Bartholomeuz R., and Chesnut R. W.. 1995. Development of a lipopeptide-based therapeutic vaccine to treat chronic HBV infection. *J. Clin. Invest.* 95 341:349

REVENDICATIONS

1. Procédé d'identification de composés peptidiques dérivés d'hsp70, qui présentent
5 au moins une mutation ou une altération par rapport à la séquence naturelle d'hsp70, lesdits composés entraînant une réponse T spécifique des tumeurs, comprenant les étapes suivantes :
 - a) amplification PCR d'un fragment d'ADN codant pour hsp70 obtenu à partir d'une ou de plusieurs tumeur(s),
 - 10 b) clonage de l'ADN obtenu à l'étape a) dans un vecteur capable de se répliquer dans une bactérie,
 - c) séquençage dudit fragment dans chaque colonie bactérienne obtenue après culture des bactéries de l'étape b) et identification de la ou des mutation(s) dans hsp70.
 - d) détermination de l'immunogénicité des fragments peptidiques mutés parmi ceux
15 identifiés à l'étape c).
2. Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce que l'étape d) consiste en un test Elispot.
3. Procédé selon l'une des revendication 1 et 2 caractérisé en ce que l'on teste de
20 préférence les fragments peptidiques qui possèdent une séquence d'ancrage pour une molécule HLA donnée.
4. Procédé selon l'une des revendication 1 à 3 caractérisé en ce que les fragments peptidiques à tester à l'étape d) sont obtenus par synthèse chimique.
5. Procédé de mise en évidence de mutations ou d'altérations ponctuelles artificielles susceptibles d'augmenter l'immunogénicité des composés peptidiques mutés
25 dérivés d'hsp70 caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes :
 - a) Détermination de fragments possédant une séquence d'environ 9 à 10 acides aminés comportant un motif d'ancrage pour une molécule HLA donnée,
 - b) introduction d'une mutation ou d'une altération (par exemple une modification post traductionnelle) ponctuelle supplémentaire au niveau des résidus 4, 5, 6, 7 ou
30 8,
 - c) détermination de l'immunogénicité des fragments peptidiques obtenus à l'étape b).


6. Procédé selon la revendication 5 caractérisé en ce que l'étape c) consiste en un test Elispot.
7. Composé peptidique susceptible d'être obtenu à partir d'un procédé selon l'une des revendications 1 à 5 caractérisé en ce qu'il comprend une séquence d'au moins 8 acides aminés consécutifs d'hsp70 présentant au moins une mutation ou une altération par rapport à la séquence naturelle d'hsp70, et ce qu'il entraîne une réponse T spécifique.
8. Composé peptidique selon la revendication 7 ayant au moins 80 % d'homologie avec les acides aminés entre les positions 286 et 294 d'hsp70.
9. Composé peptidique selon la revendication 8 caractérisé en ce que l'acide aminé à la position 293 est de préférence l'isoleucine, la leucine, la valine, l'alanine, la glycine, ou la phénylalanine, plus particulièrement l'isoleucine.
10. Composé peptidique selon la revendication 9 qui a au moins la séquence SEQ ID n°1 ou SEQ ID n°2.
11. Composé peptidique selon l'une des revendications 7 à 10 caractérisé en ce qu'il comporte au moins un élément différent des acides aminés naturels.
12. Fragment d'ADN codant au moins pour un fragment peptidique de l'une des revendications 7 à 11.
13. Vecteur d'expression d'un fragment peptidique selon l'une des revendications 7 à 11 contenant le fragment d'ADN de la revendication 12 fusionné à un promoteur fort et efficace dans les cellules eukaryotes, et/ou dans les cellules procaryotes, en particulier dans les cellules humaines.
14. Vecteur d'expression selon la revendication 13 comprenant en outre un ou plusieurs marqueur(s) de sélection et éventuellement une ou plusieurs séquence(s) codante(s) pour des facteurs d'activation des défenses immunitaires, tels que des cytokines et/ou des lymphokines.
15. Vecteur selon l'une des revendications 13 et 14 caractérisé en ce qu'il s'agit d'un vecteur viral, d'un plasmide, ou d'un pseudo-vecteur.
16. Cellules dendritiques chargées en composés peptidiques selon l'une des revendications 7 à 11.
17. Cellules dendritiques transformées par le vecteur d'expression selon l'une des revendications 13 à 15.

18. Cellules dendritiques selon l'une des revendications 16 et 17 caractérisées en ce qu'elles font parties des macrophages.
19. Composition pharmaceutique comprenant un composé peptidique ou un mélange de composés peptidiques selon l'une des revendications 7 à 11 et un véhicule pharmaceutiquement acceptable.
20. Composition pharmaceutique selon la revendication 19 caractérisée en ce qu'elle comporte en outre un ou plusieurs adjuvants immunologiques, notamment des facteurs cytotoxiques des tumeurs.
21. Composition pharmaceutique comprenant un vecteur d'expression selon l'une des revendications 13 à 15 et un véhicule pharmaceutiquement acceptable.
22. Composition pharmaceutique comprenant notamment un fragment d'ADN selon la revendication 12 et un véhicule pharmaceutiquement acceptable.
23. Composition pharmaceutique comprenant les cellules selon l'une des revendications 16 à 18 et un véhicule pharmaceutiquement acceptable.
24. Produit de combinaison comprenant au moins un composé peptidique selon l'une des revendications 7 à 11 et au moins un agent induisant un stress cellulaire pour une utilisation simultanée, séparée ou étalée dans le temps destiné au traitement du cancer.
25. Produit de combinaison selon la revendication 24 caractérisé en ce que ledit agent est susceptible d'induire une surexpression des protéines de chocs thermiques, en particulier hsp70.
26. Produit de combinaison selon la revendication 24 caractérisé en ce que ledit agent est un inducteur de l'apoptose, sélectionné notamment parmi les agents qui endommagent l'ADN, les ligands du récepteur aux glucocorticoïdes, ou parmi les seconds messagers pro-apoptotiques.
27. Produit de combinaison selon la revendication 24 comprenant un vecteur viral qui possède un gène qui code pour une enzyme permettant d'activer les agents pro-apoptotique, notamment la thymidine kinase.
28. Produit de combinaison selon la revendication 24 dans lequel l'agent induisant un stress cellulaire est sélectionné parmi les composés induisant une hypoxie des tumeurs, notamment les inhibiteurs de l'angiogénèse.

29. Composition pharmaceutique selon l'une des revendications 19 à 23 ou produit de combinaison selon l'une des revendications 24 à 28 caractérisée en ce qu'il comporte en outre un ou plusieurs adjuvants immunologiques, notamment des agents cytotoxiques des tumeurs.
- 5 30. Composition pharmaceutique selon l'une des revendications 19 à 23 ou produit de combinaison selon l'une des revendications 24 à 29 caractérisé en qu'il comporte un véhicule pharmaceutique compatible avec une administration IV, subcutanée, orale, ou nasale.
- 10 31. Composition pharmaceutique selon l'une des revendications 19 à 23 ou produit de combinaison selon l'une des revendications 24 à 29 caractérisé en ce qu'il comporte un véhicule pharmaceutique sélectionné parmi les liposomes, les nanoparticules, ou les émulsions lipidiques, chargés positivement ou négativement.
32. Utilisation d'un composé peptidique selon l'une des revendications 7 à 11 pour la fabrication d'un médicament.
- 15 33. Utilisation d'un composé peptidique selon l'une des revendications 7 à 11 pour la fabrication d'un médicament destiné au traitement du cancer.
34. Utilisation d'un composé peptidique selon l'une des revendications 7 à 11 pour la fabrication d'un médicament destiné à une immunisation ex situ.
35. Utilisation d'un composé peptidique selon l'une des revendications 7 à 11 pour la fabrication d'un médicament destiné à une immunisation in situ.
- 20 36. Utilisation d'un composé peptidique selon l'une des revendications 7 à 11 pour la fabrication d'un médicament destiné au traitement du cancer, en particulier des tumeurs solides, notamment des carcinomes, des mélanomes, des neuroblastomes, des cancers du cou et de la tête, de préférence des carcinomes du rein.
- 25 37. Utilisation d'un composé peptidique selon l'une des revendications 7 à 11 pour augmenter en milieu de culture la population des CTL des tumeurs et/ou induire la sécrétion par lesdits CTL de facteurs cytotoxiques tels que par exemple IL-2, IFN- γ et TNF.
- 30 38. Utilisation d'un composé peptidique selon l'une des revendications 7 à 11 pour la fabrication d'un médicament destiné à stimuler les défenses immunitaires, en particulier pour augmenter la population des CTL des tumeurs et/ou induire la


sécrétion par lesdits CTL de facteurs cytotoxiques tels que par exemple IL-2, IFN- γ et TNF.

39. Utilisation selon l'une des revendication 32 à 38 en combinaison avec la radiothérapie.
- 5 40. Utilisation selon l'une des revendication 32 à 39 pour effectuer une immunisation répétée en vue de provoquer une rupture de tolérance contre le peptide naturel correspondant (non muté) chez un patient.
41. Procédé de production d'un anticorps qui se lie à un mutant d'hsp70, en particulier au mutant hsp70-2 I-293, comprenant les étapes consistant à :
 - 10 a) Immuniser un mammifère avec un composé peptidique selon l'une des revendication 7 à 11,
 - b) isoler un anticorps monoclonal qui se lie à hsp70-2-293, particulièrement à hsp70-2 I-293, dans un essai immunologique.
42. Anticorps monoclonal qui se lie à un fragment d'hsp70-muté, particulièrement à hsp70-2 I-293.
15
43. Procédé de détection de d'hsp70 muté, en particulier de la mutation ou de l'altération de l'hsp70-2 I-293, comprenant les étapes consistant à :
 - a) Mettre en contact un échantillon prélevé chez un individu avec un anticorps monoclonal selon la revendication 42,
 - 20 b) permettre la formation du complexe anticorps- hsp70-muté, en particulier du complexe anticorps- hsp70-2-293,
 - c) détecter hsp70-muté au moyen d'un marqueur détectable dans le complexe ou qui se lie au complexe.
44. Trousse de diagnostic comportant notamment un anticorps selon la revendication
25 42 pour la détection du cancer.
45. Trousse de diagnostic comportant notamment un anticorps selon la revendication 42 pour le pronostique du cancer déclaré chez un individu.
46. Composition pharmaceutique comprenant notamment un anticorps monoclonal selon la revendication 42 et un véhicule pharmaceutiquement acceptable.




Activité spécifique lytique du clone 11C2
contre la lignée cellulaire autologue RCC-7

FIG.1




**Sécrétion de TNF par le clone CTL-11C2 lors de la stimulation
avec la lignée cellulaire autologue RCC-7**

FIG. 2





Cytotoxicité des CTL 11C2 sur de multiples
lignées cellulaires allogéniques RCC

FIG. 3




**Stimulation du CTL 11C2 par les cellules
co-transfectées temporairement avec
l'ADNc HLA-A*0201 autologue et l'ADNc A18**

FIG. 4




Localisation de la région épitopique d'HSP70 reconnue par le CTL 11C2

FIG.5




Lyse par CTL 11C2 de la lignée cellulaire autologue transformée par EBV et incubée avec les peptides codés par HSP70-2

FIG. 6



Induction de l'expression d'HLA-A2 sur les cellules T2 par les peptides antigéniques d'HSP70-2

FIG.7



Analyse Northern Blot

FIG. 8




FIG.9

<110> INSTITUT GUSTAVE ROUSSY

<120> COMPOSES PEPTIDIQUES MUTES DERIVES DE hsp70, UTILES DANS L'IMMUNOTHERAPIE DU CANCER .

<130> D17452

<140>

<141>

<150> FR 98 05033

<151> 1998-04-22

<160> 6

<170> PatentIn Vers. 2.0

<210> 1

<211> 9

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 1

Ser Leu Phe Glu Gly Ile Asp Ile Tyr

1

5

<210> 2

<211> 10

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<400> 2

Ser Leu Phe Glu Gly Ile Asp Ile Tyr Thr

1

5

10

1

5

10

<210> 3

<211> 37

<212> ADN

<213> Homo sapiens

<400> 3

gggcaagctt ggactcagaa tctccccaga cgccgag

37

<210> 4

<211> 36

<212> ADN

<213> Homo sapiens

<400> 4

gccctctaga tctcagtcctc tcacaaggca gctgtc

36

<210> 5

<211> 30

<212> ADN

<213> Homo sapiens

<220>

<223> Sonde HSP702A

<400> 5

gggcaagctt agtctcagag cggagccaac

30

<210> 6

<211> 30

<212> ADN

<213> Homo sapiens

<220>

<223> Sonde HSP70-2B

<400> 6

gccctctaga gtcccaacag tccacctcaa

30

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 6 C12N15/12 C07K14/47 C07K16/18 C12N15/63 C12N5/10
 A61K38/17 A61K39/395 G01N33/68

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 6 C07K C12N A61K G01N

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	FAGAN, MELINDA B. ET AL: "Sequence and characterization of two HSP70 genes in the colonial protochordate Botryllus schlosseri" IMMUNOGENETICS (1996), 44(2), 134-142 CODEN: IMNGBK; ISSN: 0093-7711, 1996, XP002091655 figure 2	9
X	GUTIERREZ, JESUS A. ET AL: "Chemical modifications of a recombinant bovine stress-inducible 70 kDa heat-stock protein (Hsp70) mimics Hsp70 isoforms from tissues" BIOCHEM. J. (1995), 305(1), 197-203 CODEN: BIJOAK; ISSN: 0264-6021, 1995, XP002091656 figure 2	9

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☐ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
 "E" earlier document but published on or after the international filing date
 "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
 "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
 "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
 "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
 "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
 "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

11 August 1999

Date of mailing of the international search report

19/08/1999

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentaan 2
 NL - 2280 HV Rijswijk
 Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
 Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Fuhr, C

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	<p>BORCHIELLINI, C. ET AL: "Phylogenetic analysis of the Hsp70 sequences reveals the monophyly of metazoa and specific phylogenetic relationships between animals and fungi"</p> <p>MOL. BIOL. EVOL. (1998), 15(6), 647-655 CODEN: MBEVE0; ISSN: 0737-4038, 1998, XP002091657 figure 1</p> <p>---</p>	9
X	<p>SAINIS, IOANNIS ET AL: "The hsc70 gene which is slightly induced by heat is the main virus inducible member of the hsp70 gene family"</p> <p>FEBS LETT. (1994), 355(3), 282-6 CODEN: FEBLAL; ISSN: 0014-5793, 1994, XP002091658 figure 3</p> <p>---</p>	9
A	<p>B. GAUGLER ET AL.: "A new gene coding for an antigen recognized by autologous cytolytic T lymphocytes on a human renal carcinoma"</p> <p>IMMUNOGENETICS, vol. 44, no. 5, 1996, pages 323-330, XP002091659 page 328, left-hand column, paragraph 3 - page 329, left-hand column, paragraph 2</p> <p>---</p>	9
A	<p>N.E. BLACHER ET AL.: "Heat Shock Protein-Peptide complexes, Reconstituted In Vitro, Elicit Peptide-specific Cytotoxic T Lymphocyte Response and Tumor Immunity"</p> <p>JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE, vol. 186, no. 8, October 1997 (1997-10), pages 1315-1322, XP002091660 cited in the application page 1319, right-hand column, last paragraph - page 1321, right-hand column, last paragraph</p> <p>---</p>	9
A	<p>S.A. ROSENBERG ET AL.: "Immunologic and therapeutic evaluation of a synthetic peptide vaccine for the treatment of patients with metastatic melanoma"</p> <p>NATURE MEDICINE., vol. 4, no. 3, March 1998 (1998-03), pages 321-327, XP002091661 CO US cited in the application page 324, left-hand column, paragraph 4 - page 325, right-hand column, paragraph 2</p> <p>-----</p>	9

PCT/FR 99/00301					
A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE CIB 6 C12N15/12 C07K14/47 C07K16/18 C12N15/63 C12N5/10 A61K38/17 A61K39/395 G01N33/68					
Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB					
B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement) CIB 6 C07K C12N A61K G01N					
Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche					
Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)					
C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS					
Catégorie *	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents				no. des revendications visées
X	FAGAN, MELINDA B. ET AL: "Sequence and characterization of two HSP70 genes in the colonial protochordate Botryllus schlosseri" IMMUNOGENETICS (1996), 44(2), 134-142 CODEN: IMNGBK;ISSN: 0093-7711,1996, XP002091655 figure 2				9
X	GUTIERREZ, JESUS A. ET AL: "Chemical modifications of a recombinant bovine stress-inducible 70 kDa heat-stock protein (Hsp70) mimics Hsp70 isoforms from tissues" BIOCHEM. J. (1995), 305(1), 197-203 CODEN: BIJOAK;ISSN: 0264-6021,1995, XP002091656 figure 2				9
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div>---</div> <div>---/---</div> <div>---</div> </div>					
<input checked="" type="checkbox"/> Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents <input type="checkbox"/> Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe					
* Catégories spéciales de documents cités:					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p>"A" document définissant l'état général de la technique, non, considéré comme particulièrement pertinent</p> <p>"E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date</p> <p>"L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)</p> <p>"O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens</p> <p>"P" document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée</p> </div> <div style="width: 48%;"> <p>"T" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention</p> <p>"X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément</p> <p>"Y" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier</p> <p>"&" document qui fait partie de la même famille de brevets</p> </div> </div>					
Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée			Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale		
11 août 1999			19/08/1999		
Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016			Fonctionnaire autorisé		
			Fuhr, C		

C.(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		
Catégorie	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
X	<p>BORCHIELLINI, C. ET AL: "Phylogenetic analysis of the Hsp70 sequences reveals the monophyly of metazoa and specific phylogenetic relationships between animals and fungi"</p> <p>MOL. BIOL. EVOL. (1998), 15(6), 647-655</p> <p>CODEN: MBEVEO; ISSN: 0737-4038, 1998, XP002091657</p> <p>figure 1</p> <p>----</p>	9
X	<p>SAINIS, IOANNIS ET AL: "The hsc70 gene which is slightly induced by heat is the main virus inducible member of the hsp70 gene family"</p> <p>FEBS LETT. (1994), 355(3), 282-6 CODEN: FEBLAL; ISSN: 0014-5793, 1994, XP002091658</p> <p>figure 3</p> <p>----</p>	9
A	<p>B. GAUGLER ET AL.: "A new gene coding for an antigen recognized by autologous cytolytic T lymphocytes on a human renal carcinoma"</p> <p>IMMUNOGENETICS,</p> <p>vol. 44, no. 5, 1996, pages 323-330,</p> <p>XP002091659</p> <p>page 328, colonne de gauche, alinéa 3 -</p> <p>page 329, colonne de gauche, alinéa 2</p> <p>----</p>	9
A	<p>N.E. BLACHER ET AL.: "Heat Shock Protein-Peptide complexes, Reconstituted In Vitro, Elicit Peptide-specific Cytotoxic T Lymphocyte Response and Tumor Immunity"</p> <p>JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE,</p> <p>vol. 186, no. 8, octobre 1997 (1997-10),</p> <p>pages 1315-1322, XP002091660</p> <p>cité dans la demande</p> <p>page 1319, colonne de droite, dernier alinéa - page 1321, colonne de droite, dernier alinéa</p> <p>----</p>	9
A	<p>S.A. ROSENBERG ET AL.: "Immunologic and therapeutic evaluation of a synthetic peptide vaccine for the treatment of patients with metastatic melanoma"</p> <p>NATURE MEDICINE.,</p> <p>vol. 4, no. 3, mars 1998 (1998-03), pages 321-327, XP002091661</p> <p>CO US</p> <p>cité dans la demande</p> <p>page 324, colonne de gauche, alinéa 4 -</p> <p>page 325, colonne de droite, alinéa 2</p> <p>-----</p>	9

TRAITE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS

PCT

NOTIFICATION D'ELECTION

(règle 61.2 du PCT)

Expéditeur: le BUREAU INTERNATIONAL

Destinataire:

Assistant Commissioner for Patents
United States Patent and Trademark
Office
Box PCT
Washington, D.C.20231
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

en sa qualité d'office élu

Date d'expédition (jour/mois/année) 07 décembre 1999 (07.12.99)	
Demande internationale no PCT/FR99/00957	Référence du dossier du déposant ou du mandataire 339828/17452
Date du dépôt international (jour/mois/année) 22 avril 1999 (22.04.99)	Date de priorité (jour/mois/année) 22 avril 1998 (22.04.98)
Déposant TRIEBEL, Frédéric etc	

1. L'office désigné est avisé de son élection qui a été faite:



dans la demande d'examen préliminaire international présentée à l'administration chargée de l'examen préliminaire international le:

15 novembre 1999 (15.11.99)



dans une déclaration visant une élection ultérieure déposée auprès du Bureau international le:

2. L'élection



a été faite



n'a pas été faite

avant l'expiration d'un délai de 19 mois à compter de la date de priorité ou, lorsque la règle 32 s'applique, dans le délai visé à la règle 32.2b).

Bureau international de l'OMPI 34, chemin des Colombettes 1211 Genève 20, Suisse	Fonctionnaire autorisé Antonia Muller
no de télécopieur: (41-22) 740.14.35	no de téléphone: (41-22) 338.83.38

9
T
5630
Translation

PATENT COOPERATION TREATY

09673795

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 339828/17452	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/FR99/00957	International filing date (day/month/year) 22 April 1999 (22.04.99)	Priority date (day/month/year) 22 April 1998 (22.04.98)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC C12N 15/12		
Applicant INSTITUT GUSTAVE-ROUSSY		

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.

2. This REPORT consists of a total of 6 sheets, including this cover sheet.

☐ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).

These annexes consist of a total of _____ sheets.

3. This report contains indications relating to the following items:

- I ☒ Basis of the report
- II ☐ Priority
- III ☐ Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- IV ☐ Lack of unity of invention
- V ☒ Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- VI ☐ Certain documents cited
- VII ☒ Certain defects in the international application
- VIII ☒ Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 15 November 1999 (15.11.99)	Date of completion of this report 30 June 2000 (30.06.2000)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/FR99/00957

I. Basis of the report

1. This report has been drawn on the basis of (*Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.*):

- ☐ the international application as originally filed.
- ☒ the description, pages 1-34, as originally filed,
 pages _____, filed with the demand,
 pages _____, filed with the letter of _____,
 pages _____, filed with the letter of _____.
- ☒ the claims, Nos. 1-46, as originally filed,
 Nos. _____, as amended under Article 19,
 Nos. _____, filed with the demand,
 Nos. _____, filed with the letter of _____,
 Nos. _____, filed with the letter of _____.
- ☒ the drawings, sheets/fig 1/9-9/9, as originally filed,
 sheets/fig _____, filed with the demand,
 sheets/fig _____, filed with the letter of _____,
 sheets/fig _____, filed with the letter of _____.

2. The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages _____
- ☐ the claims, Nos. _____
- ☐ the drawings, sheets/fig _____

3. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).

4. Additional observations, if necessary:

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.
PCT/FR 99/00957

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. Statement

Novelty (N)	Claims	1-6, 10, 13-46	YES
	Claims	7-9, 11, 12	NO
Inventive step (IS)	Claims	1-6, 10	YES
	Claims	7-9, 11-46	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-46	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

1. The following document is referred to:

D1: Mol. Biol. Evol.

Vol. 15, No. 6, pp. 647-655, 1988

2. The subject matter of Claims 1-6 and 10 is neither specifically described nor suggested in the prior art. Consequently these claims may be considered novel and inventive.
3. The subject matter of Claim 7 is a peptide compound comprising 8 consecutive amino acids of hsp70, having at least one modification relative to the hsp70 sequence. This peptide compound provokes a specific T response. As the sequence of 8 consecutive amino acids has at least one mutation or alteration, the resulting sequence can be completely different from the natural hsp70 sequence. As the peptide compound comprises, and therefore is not limited to, this fragment of 8 amino acids, the subject matter of Claim 7 includes all antigens having at least 8 amino acids which bring about a specific T response. A very large number of known peptide compounds have such antigenic activity (for

example, see description, page 3, lines 11-32). Claim 7 specifies that the claimed peptide compound "can be obtained using a method according to any one of Claims 1 to 5". This wording does not make it possible to limit the extent of the claim as the wording shows that the claimed compound can also be obtained by other methods. Consequently the subject matter of Claims 7, 11 and 12 is not novel.

Not all known hsp70s are of the same length or have exactly the same sequence. In some hsp70s the region that corresponds to amino acids 286-294 is highly variable (for example, see D1, figure 1). Moreover some of these hsp 70s have, for example, a leucine in position 293. The subject matter of Claims 8 and 9 is therefore not novel. In this context it should be noted that the reference to amino acids introduced by the expression "preferably" (Claim 9) is not exhaustive and cannot be considered as limiting the subject matter of the claim concerned.

Consequently Claims 7-9, 11 and 12 do not meet the requirements of PCT Article 33(2).

4. The role of antigenic peptide compounds in stimulating the immune defences, particularly by means of cytotoxic T lymphocytes, is known in the prior art. A large number of peptide compounds bringing about a specific T response, of the kind defined in Claims 7-9 and 11, are available to a person skilled in the art; examples are the RAGE-1 antigen expressed in many tumours, particularly kidney cancer cells, and recognised by autologous CTLs; or antigenic peptides isolated from cancerous cells or cells infected by viruses (see, in particular, description, page 3, lines 20-32).

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.
PCT/FR 99/00957

Therefore, simply by applying this knowledge and classical molecular and cellular biology techniques, one would achieve the subject matter of Claims 13-46 without applying any inventive step. These claims are thus not inventive. Consequently, Claims 13-46 do not meet the requirements of PCT Article 33 (3).

VII. Certain defects in the international application

The following defects in the form or contents of the international application have been noted:

1. Figures 1-8 contain text beyond what is authorised by Rule 11.11a) (See likewise Guidelines II-5 PCT).
2. The subject matter of dependent Claims 29-31 is not limited to a single product, as should be the case, but to two different products: a pharmaceutical composition or a combination product.
3. Independent Claims 32-36 and 38 refer to the use of a peptide compound to produce a drug. Although Claims 32-36 and 38 were drafted as independent claims, their subject matter is the same. Claims 33-36 and 38 differ from Claim 32 in specifying the purpose which the drug produced is to serve. Claims 33-36 and 38 differ from one another by the purpose which the drug produced is to serve. Consequently it appears appropriate to amend Claims 33-36 and 38 to make them dependent on Claim 32 (PCT Rule 6.4).

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/FR 99/00957

VIII. Certain observations on the international application

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully supported by the description, are made:

1. The expression "derived" in Claims 1 and 5 is vague and not defined. It does not relate to any technical feature and may be subject to interpretation. Indeed, a peptide may derive from another peptide or from a protein in such a way that the resulting product is completely different in structure and function from the original product (PCT Art. 6).
2. Claim 11 lacks clarity by virtue of the wording "an element different from natural amino acids". This wording is extremely vague, imprecise and not defined. It does not relate to any technical feature and may be subject to interpretation. Consequently, Claim 11 does not meet the requirements of PCT Article 6.
3. Claims 24-31 lack clarity by virtue of the expression "combination product". This expression is not suitable for defining the subject matter claimed due to the fact that this concept is not clearly defined (PCT Art. 6).

TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS

PCT

REC'D 05 JUL 2000

WIPO

PCT

RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

(article 36 et règle 70 du PCT)



Référence du dossier du déposant ou du mandataire 339828/17452	POUR SUITE A DONNER voir la notification de transmission du rapport d'examen préliminaire international (formulaire PCT/IPEA/416)	
Demande internationale n° PCT/FR99/00957	Date du dépôt international (jour/mois/année) 22/04/1999	Date de priorité (jour/mois/année) 22/04/1998
Classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois classification nationale et CIB C12N15/12		
Déposant INSTITUT GUSTAVE-ROUSSY et al.		

1. Le présent rapport d'examen préliminaire international, établi par l'administration chargée de l'examen préliminaire international, est transmis au déposant conformément à l'article 36.
2. Ce RAPPORT comprend 6 feuilles, y compris la présente feuille de couverture.
 - ☐ Il est accompagné d'ANNEXES, c'est-à-dire de feuilles de la description, des revendications ou des dessins qui ont été modifiées et qui servent de base au présent rapport ou de feuilles contenant des rectifications faites auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international (voir la règle 70.16 et l'instruction 607 des Instructions administratives du PCT).

Ces annexes comprennent feuilles.

3. Le présent rapport contient des indications relatives aux points suivants:

- I ☒ Base du rapport
- II ☐ Priorité
- III ☐ Absence de formulation d'opinion quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle
- IV ☐ Absence d'unité de l'invention
- V ☒ Déclaration motivée selon l'article 35(2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration
- VI ☐ Certains documents cités
- VII ☒ Irrégularités dans la demande internationale
- VIII ☒ Observations relatives à la demande internationale

Date de présentation de la demande d'examen préliminaire internationale 15/11/1999	Date d'achèvement du présent rapport 30.06.2000
Nom et adresse postale de l'administration chargée de l'examen préliminaire international:  Office européen des brevets D-80298 Munich Tél. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Fonctionnaire autorisé Chavanne, F N° de téléphone +49 89 2399 8399 

**RAPPORT D'EXAMEN
PRELIMINAIRE INTERNATIONAL**

Demande internationale n° PCT/FR99/00957

I. Base du rapport

1. Ce rapport a été rédigé sur la base des éléments ci-après (*les feuilles de remplacement qui ont été remises à l'office récepteur en réponse à une invitation faite conformément à l'article 14 sont considérées, dans le présent rapport, comme "initialement déposées" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'elles ne contiennent pas de modifications.*) :

Description, pages:

1-34 version initiale

Revendications, N°:

1-46 version initiale

Dessins, feuilles:

1/9-9/9 version initiale

2. Les modifications ont entraîné l'annulation :

- ☐ de la description, pages :
- ☐ des revendications, n°s :
- ☐ des dessins, feuilles :

3. ☐ Le présent rapport a été formulé abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont été considérées comme allant au-delà de l'exposé de l'invention tel qu'il a été déposé, comme il est indiqué ci-après (règle 70.2(c)) :

4. Observations complémentaires, le cas échéant :

**RAPPORT D'EXAMEN
PRELIMINAIRE INTERNATIONAL**

Demande internationale n° PCT/FR99/00957

V. Déclaration motivée selon l'article 35(2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration

1. Déclaration

Nouveauté	Oui : Revendications 1-6, 10, 13-46 Non : Revendications 7-9, 11, 12
Activité inventive	Oui : Revendications 1-6, 10 Non : Revendications 7-9, 11-46
Possibilité d'application industrielle	Oui : Revendications 1-46 Non : Revendications

2. Citations et explications

voir feuille séparée

VII. Irrégularités dans la demande internationale

Les irrégularités suivantes, concernant la forme ou le contenu de la demande internationale, ont été constatées :

voir feuille séparée

VIII. Observations relatives à la demande internationale

Les observations suivantes sont faites au sujet de la clarté des revendications, de la description et des dessins et de la question de savoir si les revendications se fondent entièrement sur la description :

voir feuille séparée

V. Déclaration motivée selon la règle 66.2(a)(ii) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration

1. Il est fait référence au document suivant:

D1: Mol. Biol. Evol.

Vol. 15, No. 6, pp. 647-655, 1998

2. L'objet des revendications 1-6 et 10 n'est ni décrit de manière spécifique, ni suggéré dans l'art antérieur. Par conséquent, ces revendications peuvent être considérées comme nouvelles et inventives.
3. L'objet de la revendication 7 est un composé peptidique qui comprend 8 acides aminés consécutifs d'hsp70 présentant au moins une modification par rapport à la séquence d'hsp70. Ce composé peptidique entraîne une réponse T spécifique. La séquence de 8 acides aminés consécutif présentant au moins une mutation ou altération, la séquence résultante peut être complètement différente de celle de la séquence naturelle d'hsp70. Le composé peptidique comprenant, et donc n'étant pas limité à ce fragment de 8 acides aminés, l'objet de la revendication 7 inclut donc tous les antigènes d'au moins 8 acides aminés qui entraînent une réponse T spécifique. Il existe de très nombreux composés peptidiques connus ayant une telle activité antigénique (voir; par exemple, description, page 3, lignes 11-32). Il est précisé dans la revendication 7 que le composé peptidique revendiqué est "susceptible d'être obtenu à partir d'un procédé selon l'une des revendications 1 à 5". Cette formulation ne permet de limiter l'étendue de la revendication puisqu'il ressort de cette formulation que le composé revendiqué peut également être obtenu par d'autres procédés. Par conséquent, l'objet des revendications 7, 11 et 12 n'est pas nouveau.
- Toutes les hsp70 connues n'ont pas la même longueur ni exactement la même séquence. Pour certaines de ces hsp70, la région correspondant aux acides aminés 286-294 est hautement variable (voir par exemple, D1, figure 1). De plus, certaines de ces hsp70 présentent en position 293 une Leucine, par exemple. L'objet des revendications 8 et 9 n'est donc pas nouveau. Dans ce contexte, il est à noter que la référence à des acides aminés introduits par l'expression "de

préférence" (revendication 9) est non exhaustive, et ne peut être considérée comme limitant l'objet de la revendication concernée.

Par conséquent, les revendications 7-9, 11 et 12 ne remplissent pas les conditions de l'Article 33(2) PCT.

4. Le rôle des composés peptidiques antigéniques dans la stimulation des défenses immunitaires, notamment par l'intermédiaire des lymphocytes T cytotoxiques, est connu dans l'état de la technique. L'homme du métier dispose de nombreux composés peptidiques entraînant une réponse T spécifique tels que définis dans les revendications 7-9 et 11. Par exemple, l'antigène RAGE-1 exprimé dans de nombreuses tumeurs, notamment les cellules du carcinome du rein, et reconnu par des CTL autologues, ou les peptides antigéniques isolés à partir de cellules cancéreuses ou infectées par des virus (voir, notamment, description, page 3, lignes 20-32). Donc, par la simple mise en oeuvre de ces connaissances et des techniques classiques de biologie moléculaire et cellulaire, arriverait à l'objet des revendications 13-46 sans mise en oeuvre d'aucune activité inventive. Ces revendications ne sont donc pas inventives. Par conséquent, les revendications 13-46 ne remplissent pas les conditions de l'Article 33(3) PCT.

VII. Irrégularités dans la demande internationale

1. Les figures 1-8 contiennent du texte au delà de ce qui est autorisé selon la Règle 11.11a) (voir également Directives II-5 PCT).
2. L'objet des revendications dépendantes 29-31 n'est pas limité à un seul produit comme cela devrait être le cas, mais à deux produits différents: une composition pharmaceutique ou un produit de combinaison.
3. Les revendications indépendantes 32-36 et 38 se réfèrent à l'utilisation d'un composé peptidique pour la fabrication d'un médicament. Bien que les revendications 32-36 et 38 aient été rédigées comme revendications indépendantes, elles correspondent toutes au même objet. Les revendications 33-36 et 38 se différencient de la revendication 32 en spécifiant la destination du médicament fabriqué. Les revendications 33-36 et 38 se différencient les unes

des autres par la destination du médicament fabriqué. Par conséquent, il apparaît approprié d'amender les revendications 33-36 et 38 pour les rendre dépendantes de la revendication 32 (Règle 6.4 PCT).

VIII. Observations relatives à la demande internationale

1. L'expression "dérivé" des revendications 1 et 5 est vague et non définie. Elle ne se réfère à aucune caractéristique technique et peut être sujette à interprétation. En effet, un peptide peut dériver d'un autre peptide ou d'une protéine de telle manière que le produit résultant soit complètement différent de par sa structure et ses fonctions du produit de départ (Art. 6 PCT).
2. La revendication 11 manque de clarté de par la formulation "un élément différent des acides aminés naturels". Cette formulation est tellement vague, imprécise et non définie. Elle ne se réfère à aucune caractéristique technique et peut être sujette à interprétation. Par conséquent, la revendication 11 ne remplit pas les conditions de l'Article 6 PCT.
3. Les revendications 24-31 manquent de clarté de par l'expression "produit de combinaison". Cette expression n'est pas adaptée pour définir l'objet revendiqué, du fait que ce concept n'est pas clairement défini (Art. 6 PCT).

TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS

Expéditeur: L'ADMINISTRATION CHARGÉE DE
LA RECHERCHE INTERNATIONALE

NT
Délai: 19.10.99


PCT

NOTIFICATION DE TRANSMISSION DU
RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE
OU DE LA DECLARATION

(règle 44.1 du PCT)

Destinataire

Cabinet REGIMBEAU
26, avenue Kléber
75116 Paris
FRANCE



Date d'expédition
(jour/mois/année)

19/08/1999

Référence du dossier du déposant ou du mandataire

339828/17452

POUR SUITE A DONNER

voir les paragraphes 1 et 4 ci-après

Demande internationale n°

PCT/FR 99/ 00957

Date du dépôt international
(jour/mois/année)

22/04/1999

Déposant

INSTITUT GUSTAVE-ROUSSY et al.

1. ☒ Il est notifié au déposant que le rapport de recherche internationale a été établi et lui est transmis ci-joint.

Dépôt de modifications et d'une déclaration selon l'article 19 :

Le déposant peut, s'il le souhaite, modifier les revendications de la demande internationale (voir la règle 46):

Quand?

Le délai dans lequel les modifications doivent être déposées est de deux mois à compter de la date de transmission du rapport de recherche internationale : pour plus de précisions, voir cependant les notes figurant sur la feuille d'accompagnement.

Où?

Directement auprès du Bureau international de l'OMPI
34, chemin des Colombettes
1211 Genève 20, Suisse
n° de télécopieur: (41-22)740.14.35

Pour des instructions plus détaillées, voir les notes sur la feuille d'accompagnement.

2. ☐ Il est notifié au déposant qu'il ne sera pas établi de rapport de recherche internationale et la déclaration à cet effet, prévue à l'article 17.2)a), est transmise ci-joint.

3. ☐ **En ce qui concerne la réserve** pouvant être formulée, conformément à la règle 40.2, à l'égard du paiement d'une ou de plusieurs taxes additionnelles, il est notifié au déposant que

☐ la réserve ainsi que la décision y relative ont été transmises au Bureau international en même temps que la requête du déposant tendant à ce que le texte de la réserve et celui de la décision en question soient notifiés aux offices désignés.

☐ la réserve n'a encore fait l'objet d'aucune décision: dès qu'une décision aura été prise, le déposant en sera avisé.

4. **Mesure(s) consécutive(s) :** Il est rappelé au déposant ce qui suit:

Peu après l'expiration d'un délai de **18 mois** à compter de la date de priorité, la demande internationale sera publiée par le Bureau international. Si le déposant souhaite éviter ou différer la publication, il doit faire parvenir au Bureau international une déclaration de retrait de la demande internationale, ou de la revendication de priorité, conformément aux règles 90bis.1 et 90bis.3, respectivement, avant l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale.

Dans un délai de **19 mois** à compter de la date de priorité, le déposant doit présenter la demande d'examen préliminaire international s'il souhaite que l'ouverture de la phase nationale soit reportée à 30 mois à compter de la date de priorité (ou même au-delà dans certains offices).

Dans un délai de **20 mois** à compter de la date de priorité, le déposant doit accomplir les démarches prescrites pour l'ouverture de la phase nationale auprès de tous les offices désignés qui n'ont pas été élus dans la demande d'examen préliminaire international ou dans une élection ultérieure avant l'expiration d'un délai de 19 mois à compter de la date de priorité ou qui ne pouvaient pas être élus parce qu'ils ne sont pas liés par le chapitre II.

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la
recherche internationale



Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL-2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

Claudia Aragone

TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS

PCT

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

(article 18 et règles 43 et 44 du PCT)

Référence du dossier du déposant ou du mandataire 339828/17452	POUR SUITE A DONNER voir la notification de transmission du rapport de recherche internationale (formulaire PCT/ISA/220) et, le cas échéant, le point 5 ci-après	
Demande internationale n° PCT/FR 99/ 00957	Date du dépôt international (jour/mois/année) 22/04/1999	(Date de priorité (la plus ancienne) (jour/mois/année) 22/04/1998
Déposant INSTITUT GUSTAVE-ROUSSY et al.		

Le présent rapport de recherche internationale, établi par l'administration chargée de la recherche internationale, est transmis au déposant conformément à l'article 18. Une copie en est transmise au Bureau international.

Ce rapport de recherche internationale comprend 3 feuilles.

☒ Il est aussi accompagné d'une copie de chaque document relatif à l'état de la technique qui y est cité.

1. Base du rapport

- a. En ce qui concerne la **langue**, la recherche internationale a été effectuée sur la base de la demande internationale dans la langue dans laquelle elle a été déposée, sauf indication contraire donnée sous le même point.
- ☐ la recherche internationale a été effectuée sur la base d'une traduction de la demande internationale remise à l'administration.
- b. En ce qui concerne les **séquences de nucléotides ou d'acides aminés** divulguées dans la demande internationale (le cas échéant), la recherche internationale a été effectuée sur la base du listage des séquences :
- ☒ contenu dans la demande internationale, sous forme écrite.
- ☒ déposée avec la demande internationale, sous forme déchiffrable par ordinateur.
- ☐ remis ultérieurement à l'administration, sous forme écrite.
- ☐ remis ultérieurement à l'administration, sous forme déchiffrable par ordinateur.
- ☐ La déclaration, selon laquelle le listage des séquences présenté par écrit et fourni ultérieurement ne vas pas au-delà de la divulgation faite dans la demande telle que déposée, a été fournie.
- ☐ La déclaration, selon laquelle les informations enregistrées sous forme déchiffrable par ordinateur sont identiques à celles du listage des séquences présenté par écrit, a été fournie.

2. ☐ Il a été estimé que certaines revendications ne pouvaient pas faire l'objet d'une recherche (voir le cadre I).

3. ☐ Il y a absence d'unité de l'invention (voir le cadre II).

4. En ce qui concerne le titre,

- ☒ le texte est approuvé tel qu'il a été remis par le déposant.
- ☐ Le texte a été établi par l'administration et a la teneur suivante:

5. En ce qui concerne l'abrégé,

- ☒ le texte est approuvé tel qu'il a été remis par le déposant
- ☐ le texte (reproduit dans le cadre III) a été établi par l'administration conformément à la règle 38.2b). Le déposant peut présenter des observations à l'administration dans un délai d'un mois à compter de la date d'expédition du présent rapport de recherche internationale.

6. La figure des dessins à publier avec l'abrégé est la Figure n°

- ☐ suggérée par le déposant.
- ☐ parce que le déposant n'a pas suggéré de figure.
- ☐ parce que cette figure caractérise mieux l'invention.
- ☐ Aucune des figures n'est à publier.

NOTES RELATIVES AU FORMULAIRE PCT/ISA/220 (suite)

La lettre doit indiquer les différences existant entre les revendications telles que déposées et les revendications telles que modifiées. Elle doit indiquer en particulier, pour chaque revendication figurant dans la demande internationale (étant entendu que des indications identiques concernant plusieurs revendications peuvent être groupées), si

- i) la revendication n'est pas modifiée;
- ii) la revendication est supprimée;
- iii) la revendication est nouvelle;
- iv) la revendication remplace une ou plusieurs revendications telles que déposées;
- v) la revendication est le résultat de la division d'une revendication telle que déposée.

Les exemples suivants illustrent la manière dont les modifications doivent être expliquées dans la lettre d'accompagnement:

1. [Lorsque le nombre des revendications déposées initialement s'élevait à 48 et qu'à la suite d'une modification de certaines revendications il s'élève à 51]:
"Revendications 1 à 15 remplacées par les revendications modifiées portant les mêmes numéros; revendications 30, 33 et 36 pas modifiées; nouvelles revendications 49 à 51 ajoutées."
2. [Lorsque le nombre des revendications déposées initialement s'élevait à 15 et qu'à la suite d'une modification de toutes les revendications il s'élève à 11]:
"Revendications 1 à 15 remplacées par les revendications modifiées 1 à 11."
3. [Lorsque le nombre des revendications déposées initialement s'élevait à 14 et que les modifications consistent à supprimer certaines revendications et à en ajouter de nouvelles]:
"Revendications 1 à 6 et 14 pas modifiées; revendications 7 à 13 supprimées; nouvelles revendications 15, 16 et 17 ajoutées." ou
"Revendications 7 à 13 supprimées; nouvelles revendications 15, 16 et 17 ajoutées; toutes les autres revendications pas modifiées."
4. [Lorsque plusieurs sortes de modifications sont faites]:
"Revendications 1-10 pas modifiées; revendications 11 à 13, 18 et 19 supprimées; revendications 14, 15 et 16 remplacées par la revendication modifiée 14; revendication 17 divisée en revendications modifiées 15, 16 et 17; nouvelles revendications 20 et 21 ajoutées."

"Déclaration selon l'article 19.1)" (Règle 46.4)

Les modifications peuvent être accompagnées d'une déclaration expliquant les modifications et précisant l'incidence que ces dernières peuvent avoir sur la description et sur les dessins (qui ne peuvent pas être modifiés selon l'article 19.1)).

La déclaration sera publiée avec la demande internationale et les revendications modifiées.

Elle doit être rédigée dans la langue dans laquelle la demande internationale est publiée.

Elle doit être succincte (ne pas dépasser 500 mots si elle est établie ou traduite en anglais).

Elle ne doit pas être confondue avec la lettre expliquant les différences existant entre les revendications telles que déposées et les revendications telles que modifiées, et ne la remplace pas. Elle doit figurer sur une feuille distincte et doit être munie d'un titre permettant de l'identifier comme telle, constitué de préférence des mots "Déclaration selon l'article 19.1)"

Elle ne doit contenir aucun commentaire dénigrant relatif au rapport de recherche internationale ou à la pertinence des citations que ce dernier contient. Elle ne peut se référer à des citations se rapportant à une revendication donnée et contenues dans le rapport de recherche internationale qu'en relation avec une modification de cette revendication.

Conséquence du fait qu'une demande d'examen préliminaire international ait déjà été présentée

Si, au moment du dépôt de modifications effectuées en vertu de l'article 19, une demande d'examen préliminaire international a déjà été présentée, le déposant doit de préférence, lors du dépôt des modifications auprès du Bureau international, déposer également une copie de ces modifications auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international (voir la règle 62.2a), première phrase).

Conséquence au regard de la traduction de la demande internationale lors de l'ouverture de la phase nationale

L'attention du déposant est appelée sur le fait qu'il peut avoir à remettre aux offices désignés ou élus, lors de l'ouverture de la phase nationale, une traduction des revendications telles que modifiées en vertu de l'article 19 au lieu de la traduction des revendications telles que déposées ou en plus de celle-ci.

Pour plus de précisions sur les exigences de chaque office désigné ou élu, voir le volume II du Guide du déposant du PCT.

NOTES RELATIVES AU FORMULAIRE PCT/ISA/220

Les présentes notes sont destinées à donner les instructions essentielles concernant le dépôt de modifications selon l'article 19. Les notes sont fondées sur les exigences du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), du règlement d'exécution et des instructions administratives du PCT. En cas de divergence entre les présentes notes et ces exigences, ce sont ces dernières qui priment. Pour de plus amples renseignements, on peut aussi consulter le Guide du déposant du PCT, qui est une publication de l'OMPI.

Dans les présentes notes, les termes "article", "règle" et "instruction" renvoient aux dispositions du traité, de son règlement d'exécution et des instructions administratives du PCT, respectivement.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODIFICATIONS SELON L'ARTICLE 19

Après réception du rapport de recherche internationale, le déposant a la possibilité de modifier une fois les revendications de la demande internationale. On notera cependant que, comme toutes les parties de la demande internationale (revendications, description et dessins) peuvent être modifiées au cours de la procédure d'examen préliminaire international, il n'est généralement pas nécessaire de déposer de modifications des revendications selon l'article 19 sauf, par exemple, au cas où le déposant souhaite que ces dernières soient publiées aux fins d'une protection provisoire ou a une autre raison de modifier les revendications avant la publication internationale. En outre, il convient de rappeler que l'obtention d'une protection provisoire n'est possible que dans certains Etats.

Quelles parties de la demande internationale peuvent être modifiées?

Selon l'article 19, les revendications exclusivement.

Durant la phase internationale, les revendications peuvent aussi être modifiées (ou modifiées à nouveau) selon l'article 34 auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international. La description et les dessins ne peuvent être modifiées que selon l'article 34 auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

Lors de l'ouverture de la phase nationale, toutes les parties de la demande internationale peuvent être modifiées selon l'article 28 ou, le cas échéant, selon l'article 41.

Quand?

Dans un délai de deux mois à compter de la date de transmission du rapport de recherche internationale ou de 16 mois à compter de la date de priorité, selon l'échéance la plus tardive. Il convient cependant de noter que les modifications seront réputées avoir été reçues en temps voulu si elles parviennent au Bureau international après l'expiration du délai applicable mais avant l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale (règle 46.1).

Où ne pas déposer les modifications?

Les modifications ne peuvent être déposées qu'auprès du Bureau international; elles ne peuvent être déposées ni auprès de l'office récepteur ni auprès de l'administration chargée de la recherche internationale (règle 46.2).

Lorsqu'une demande d'examen préliminaire international a été/est déposée, voir plus loin.

Comment?

Soit en supprimant entièrement une ou plusieurs revendications, soit en ajoutant une ou plusieurs revendications nouvelles ou encore en modifiant le texte d'une ou de plusieurs des revendications telles que déposées.

Une feuille de remplacement doit être remise pour chaque feuille des revendications qui, en raison d'une ou de plusieurs modifications, diffère de la feuille initialement déposée.

Toutes les revendications figurant sur une feuille de remplacement doivent être numérotées en chiffres arabes. Si une revendication est supprimée, il n'est pas obligatoire de renuméroter les autres revendications. Chaque fois que des revendications sont renumérotées, elles doivent l'être de façon continue (instruction 205.b)).

Les modifications doivent être effectuées dans la langue dans laquelle la demande internationale est publiée.

Quels documents doivent/pourraient accompagner les modifications?

Lettre (instruction 205.b)):

Les modifications doivent être accompagnées d'une lettre.

La lettre ne sera pas publiée avec la demande internationale et les revendications modifiées. Elle ne doit pas être confondue avec la "déclaration selon l'article 19.1)" (voir plus loin sous "Déclaration selon l'article 19.1)").

La lettre doit être rédigée en anglais ou en français, au choix du déposant. Cependant, si la langue de la demande internationale est l'anglais, la lettre doit être rédigée en anglais; si la langue de la demande internationale est le français, la lettre doit être rédigée en français.